

فراوانی حملات پانیک در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه... ۱۳۸۳

*^۱، غلامرضا کرمی، ^۲، کاظم قدوسی، ^۳، حسین کچوی، ^۴، علیرضا سعادت، ^۵، وحید پورفرزایانی، ^۶، میرمحسن شریفی بناب، ^۷ جواد عاملی

خلاصه

سابقه و هدف: سردردهای میگرنی از شایع ترین علل سردرد در انسان هستند که بر کیفیت زندگی و عملکرد بیمار تأثیر فراوان دارند. همراهی سردرد میگرنی با بیماریهای روان پزشکی همچون افسردگی و اختلالات اضطرابی در مطالعات مختلف بررسی شده است. سردردهای میگرنی از شایع ترین عللی می باشد که بر کیفیت زندگی و عملکرد بیماران تأثیر فراوان دارند. هدف از این مطالعه تعیین میزان فراوانی حملات پانیک در بیماران میگرنی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه... الاعظم در سال ۱۳۸۳ بوده است.

مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعی بر روی ۸۵ بیمار مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب، که بر اساس معیارهای انجمن بین المللی به سردرد میگرنی مبتلا بودند، انجام شد. تشخیص حملات پانیک به روش مصاحبه و پرسشنامه بر اساس معیار تشخیص حملات پانیک (DSM-IV) توسط متخصص روانپزشک انجام می شد. برای آنالیز داده های عددی از آزمون t test و داده های اسمی از Chi-Square استفاده شد.

نتایج: از ۸۵ بیمار، ۲۳ نفر (۲۷٪) مرد و ۶۲ نفر (۷۳٪) زن بودند. ۴۱ نفر (۴۸٪) از بیماران میگرنی به حملات پانیک مبتلا بودند که ۳۶ نفر (۸۷٪) از آنها زن بودند. ۲۹ نفر (۷۰٪) از بیماران مبتلا به حملات پانیک متأهل بودند. ۲۷ نفر (۶۵٪) از بیماران تحصیلات زیر دیپلم، ۱۰ نفر (۲۴٪) دیپلم و تنها ۴ نفر (۹٪) از مبتلایان بالاتر از دیپلم بودند ($p < 0.05$).

نتیجه گیری: فراوانی حملات پانیک در مبتلایان به سردردهای میگرنی از ارقام مورد انتظار بالاتر می باشد و با افزایش سطح تحصیلات از فراوانی آن کاسته می شود. مطالعات تحلیلی به منظور رابطه میگرن و حملات پانیک توصیه می شود.

واژگان کلیدی: سردرد، میگرن، حملات پانیک، فراوانی

۱- استادیار گروه داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ...

۲- استادیار گروه روان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ...

۳- استادیار گروه غدد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه...

۴- استادیار گروه مغز و اعصاب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه...
تاریخ دریافت: ۸۳/۱۰/۳

۵- استادیار گروه خون و انکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه...
تاریخ پذیرش نهایی: ۸۴/۱۲/۴

۶- استادیار گروه نفرولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه...
تاریخ پذیرش نهایی: ۸۴/۱۲/۴

۷- پزشک عمومی

* نویسنده مسؤل: جواد عاملی

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بیمارستان بقیه الله الاعظم، دفتر گروه داخلی اعصاب

پست الکترونیکی: Javad_amei@yahoo.com

تلفن: ۰۹۱۲ ۱۵۴ ۲۵۶۰

فاکس: ۰۲۱ ۸۸۰۳۷۵۶۰

مقدمه

علل دیگر مورد بررسی قرار گرفته بودند، ظرف ۱۴ روز قبل به سردرد مبتلا بوده اند [۲]. سردردهای میگرنی و تنشی شایع ترین اشکال سردرد هستند و در خانم ها نسبت به آقایان شایع تر هستند [۲، ۳، ۴]. در بسیاری اوقات سردردهای میگرنی با حالات و

سردرد از شایع ترین شکایات بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ها می باشد. در یک بررسی ۷۸٪ زنان و ۶۸٪ مردان از سردرد رنج می بردند [۱]. در مطالعه ای دیگر ۱۹٪ بیمارانی که به

و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

از میان ۸۵ بیمار مبتلا به میگرن ۲۳ نفر (۲۷٪) مرد و ۶۲ نفر (۷۳٪) زن بودند. ۱۱ نفر (۱۲/۹٪) زیر ۲۰ سال، ۵۶ نفر (۶۵/۹٪) بین ۲۱-۴۰ سال و ۱۸ نفر (۲۱/۲٪) بالای ۴۱ سال سن داشتند. ۳۹ نفر (۴۵/۹٪) از بیماران تحصیلات زیر دیپلم، ۲۴ نفر (۲۸/۲٪) در سطح دیپلم و ۲۲ نفر (۲۵/۹٪) بالاتر از دیپلم داشتند. ۶۴ نفر (۷۵/۳٪) به میگرن بدون اورا و ۲۱ نفر (۲۴/۷٪) به میگرن با اورا مبتلا بودند. یافته‌های تحقیق نشان داد ۴۱ نفر (۴۸/۲٪) از بیماران بر اساس معیار DSM-IV دارای علائم منطبق بر حملات پانیک بودند (جدول شماره ۱).

جدول ۱- فراوانی حملات پانیک

حملات پانیک	تعداد	درصد
ندارد	۴۴	۵۱/۸
دارد	۴۱	۴۸/۲
جمع	۸۵	۱۰۰

($p < 0.003$)

میزان فراوانی حملات پانیک در بیماران مبتلا به میگرن در زنان ۷۸/۸٪ و در مردان ۵ (۱۲/۲٪) بود. بیشترین فراوانی حملات پانیک (۷۰/۷٪) در گروه سنی ۴۰-۲۱ سال و کمترین آن در گروه سنی زیر ۲۰ سال (۶/۹٪) بود ($p < 0.001$). از نظر تحصیلات بیشترین فراوانی بیماران میگرنی در گروه تحصیلی بالای دیپلم و کمترین آن در گروه تحصیلی زیر دیپلم می باشد در حالی که فراوانی حملات پانیک در این دو گروه درست برعکس می باشد. از نظر وضعیت تأهل در مبتلایان به حملات پانیک، ۱۲ نفر (۲۹٪) مجرد و ۲۹ نفر (۷۱٪) متأهل بودند. در بیماران بدون حملات پانیک این آمار به ترتیب ۱۸ (۴۱٪) و ۲۶ (۵۹٪) نفر بود که تفاوت آماری قابل ملاحظه نبود. در بیماران دارای میگرن با اورا، ۱۲ نفر (۵۷/۱٪) از ۲۱ نفر دارای حملات پانیک بودند و در بیماران بدون اورا، ۲۹ نفر (۴۵/۳٪) از ۶۴ نفر دارای حملات پانیک بودند ($p = 0.03$). شایع ترین علامت پانیک احساس طپش قلب ۳۸ (۹۲/۶٪) و کمترین آن احساس غیرواقعی بودن خود و محیط ۹ (۲۱/۹٪) بود که در جدول شماره ۲ به ترتیب فراوانی آمده است.

بیماریهای دیگر همراهی دارند. از قدیم به دنبال یافتن ارتباط بین سردرد میگرن و خصوصیات شخصیتی، طبقه اجتماعی و میزان تحصیلات بوده اند ولی رابطه معنی داری بین این موارد مشاهده نشده است [۴، ۵، ۶]. در سال ۱۹۸۹ استوارت و همکارانش در یک مطالعه جمعیتی با هدف بررسی فراوانی حملات پانیک متوجه رابطه بین میگرن و حملات پانیک شدند [۷]. بیشترین همراهی سردرد میگرن با بیماریهای روان پزشکی به ویژه اختلالات اضطرابی و افسردگی بوده است [۴، ۸]. همراهی میگرن و اختلالات اضطرابی احتمال وجود پاتوفیزیولوژی مشترک در سیستم دوپامینرژیک را مطرح کرده است [۱۰، ۱۱]. اختلال پانیک و حملات پانیک نیز از اختلالات شایع روان پزشکی به ویژه در خانمها هستند. به طوری که ۳/۲٪ در خانمها و ۱/۳٪ مردان به آن مبتلا هستند [۱۲]. میزان همراهی این دو اختلال در بررسیهای مختلف متفاوت بوده است. آمار همراهی اختلالات اضطرابی و حملات پانیک در گزارشهای مختلف از ۲ درصد تا ۳۰ درصد متغیر بوده است [۶، ۸، ۱۳]. از آنجایی که در بروز حملات پانیک سابقه زندگی پرتنش نقش مهمی دارد [۱۴]، لذا فراوانی آن در یک منطقه بیانگر فراوانی در مناطق دیگر نیست. با توجه به این نکته که ابتلا به میگرن یکی از عوامل تنش زا در زندگی افراد می باشد. این مطالعه برای بررسی فراوانی حملات پانیک در بیماران میگرنی مراجعه کننده به بیمارستان بقیه...الاعظم در سال ۱۳۸۳ به عمل آمد.

مواد و روشها

این مطالعه به صورت مقطعی بر روی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان بقیه...الاعظم تهران صورت گرفته است. با توجه به گزارشات فراوانی ۳۰-۲ درصدی حملات پانیک در مطالعات قبلی [۶، ۸، ۱۳] حجم نمونه مورد نیاز برای مطالعه محاسبه شد. بدین ترتیب ۸۵ نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه که بر اساس معیار انجمن بین المللی سردرد [۱۵] به سردرد میگرنی مبتلا بودند وارد مطالعه شدند. سپس با استفاده از مصاحبه توسط روان پزشک و پرسشنامه طراحی شده بر اساس معیارهای تشخیصی حملات پانیک DSM-IV [۱۶] بیماران مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه در فرم اطلاعاتی ثبت و مورد ارزیابی توصیفی و تحلیلی قرار گرفت. برای داده های عددی از آزمون t-test و داده های اسمی از Chi-Square استفاده شد. داده های فرم اطلاعاتی، طبقه بندی و با استفاده از آزمونهای آماری t-test و Chi-Square مورد تجزیه

جدول ۲- فراوانی علایم حملات پانیک در ۴۱ بیمار میگرنی دارای

حملات پانیک

ردیف	علامت	تعداد	درصد
۱	احساس تپش قلب	۳۸	۹۲/۶
۲	حملات تعریق شدید	۳۳	۸۰/۴
۳	احساس لرزش در دست‌ها و بدن	۳۱	۷۵/۶
۴	احساس گزگز و مور مور شدن دست و پا	۲۵	۶۰/۹
۵	احساس تهوع یا ناراحتی در شکم	۲۳	۵۶
۶	احساس گیجی، سرگیجه، عدم تعادل	۲۲	۵۳/۶
۷	احساس و ترس از مرگ	۲۱	۵۱/۲
۸	احساس سرما و لرز یا داغ شدن	۲۱	۵۱/۲
۹	احساس تنگی نفس یا بند آمدن نفس	۱۹	۴۶/۳
۱۰	احساس خفگی	۱۷	۴۱/۴
۱۱	ترس از دیوانه شدن	۱۶	۳۹
۱۲	احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه	۱۳	۳۱/۷
۱۳	احساس غیر واقعی بودن خود و محیط	۹	۲۱/۹

بحث

در این مطالعه میزان فراوانی حملات پانیک ۴۸/۲ درصد بود که در مقایسه با سایر مطالعات خیلی بیشتر است. بیشترین میزان ذکر شده در مطالعات همراهی میگرن با حملات پانیک مربوط به Juang KD و همکارانش در تایوان به مقدار ۳۰ درصد بوده است. (۱۳) در بروز حملات پانیک مجموعه‌ای از عوامل محیطی و وراثتی نقش دارند [۱۷]. فراوانی بالای حملات پانیک در بیماران مورد مطالعه می‌تواند منعکس کننده زیاد بودن عوامل تنش‌زا در این بیماران باشد. البته با توجه به محدود بودن این مطالعه نمی‌توان آن را به تمام جامعه نسبت داد اما می‌تواند اهمیت توجه بیشتر و بررسی‌های جامع‌تر را گوشزد نماید. اگر چه این مطالعه به بیماران مبتلا به سردرد میگرن محدود بوده است اما احتمال فراوانی بالای اختلال پانیک در جامعه را نیز باید مد نظر داشت. فراوانی حملات پانیک در جامعه آمریکا حدود ۷/۳ درصد ذکر شده است [۱۲]. در بررسی فراوانی اختلالات اضطرابی که در سطح تهران به عمل آمده است حداقل ۱۵ درصد بیماران به یکی از اختلالات مبتلا بوده‌اند و این میزان در خانم‌ها ۲-۳ برابر بوده است [۱۸]. در این مطالعه نیز میزان فراوانی حملات پانیک در

بیماران زن به طور معنی‌داری بیشتر از مردان بوده است. این یافته با مطالعات دیگران و کتب رفرانس مطابقت دارد. میزان فراوانی حملات پانیک در بیماران میگرنی کمتر از ۲۰ سال به طور چشمگیری کمتر از سایر گروه‌های سنی بوده است. این مسأله می‌تواند به علت افزایش عوامل تنش‌زا بعد از این دوره سنی باشد. میزان ابتلا به حملات پانیک در بیماران میگرنی با تحصیلات زیر دیپلم ۲۷ نفر (۶۹/۲٪) بوده است در حالی که این میزان در افراد با تحصیلات دیپلم ۴۱٪ و در تحصیلات بالاتر از دیپلم کاملاً معکوس شده است و تنها ۴ نفر (۱۸/۲٪) دچار حملات پانیک می‌شدند ($p < 0.001$). اختلاف معنی‌دار فراوانی حملات پانیک در گروه‌های با تحصیلات مختلف مطرح‌کننده اثرات محافظتی افزایش تحصیلات و آگاهی‌های اجتماعی در مقابل ایجاد اختلالات اضطرابی است و احتمالاً افراد تحصیل کرده در مقابل عوامل تنش‌زا بهتر می‌توانند تطابق پیدا کنند. میزان فراوانی حملات پانیک در افراد مجرد و متأهل تفاوت معنی‌داری نداشته است. همین طور میزان فراوانی حملات پانیک در میگرن با اورا و بدون اورا تفاوت معنی‌داری را نشان نمی‌داد.

نتیجه‌گیری

با توجه به فراوانی بالای سردرد میگرن در جوامع و اثرات زیادی که این بیماری بر روی کیفیت زندگی و هزینه‌های اقتصادی که به علت درمان و عدم حضور در محل کار بر فرد و جامعه تحمیل می‌کند همواره محققان به دنبال یافتن راه‌های جدیدتری برای درمان آن هستند. این مطالعه نشان‌دهنده فراوانی نزدیک به ۱۰ برابر حملات پانیک در بیماران میگرنی به ویژه خانم‌ها است. از آنجایی که همراهی بیماریهای روان‌پزشکی با سردرد میگرن سبب تشدید سردرد می‌گردند [۱۹]، با درمان بیماری همراه ممکن است آن قدر از شدت سردرد کاسته شود که سردرد میگرن دیگر مثل قبل آزاردهنده نباشد. بدین ترتیب توجه به تشخیص و درمان بیماریهای همراه احتمالی با میگرن (به خصوص اختلال پانیک) در مدیریت بیماری میگرن مؤثر بوده و توصیه می‌شود.

References:

- 1- Taylor H. Curran NM. (1985). The Nuprin pain report. New York: Louis Harris and Associates: 1996. p. 253-255.
- 2- Rasmussen BK, Jensen R, Schroll M, Olesen J. Epidemiology of headache in a general population-a prevalence study. *J Clin Epidemiol* 1991; 44: 1147-1157.
- 3- Schwartz BS, Stewart WF, Simon D, Lipton RB. Epidemiology of tension-type headache. *JAMA* 1998; 279: 381-383.

- 4- Smoller JW. Pollack MH. Wassertheil-Smoller S. Barton B. Hendrix SL. Jackson RD. et al. Oberman A. Sheps DS. Prevalence and correlates of panic attacks in postmenopausal women: results from an ancillary study to the Women's Health Initiative. *Arch Intern Med* 2003; 163: 2041-2050.
 - 5- Cao M. Zhang S. Wang K. Wang Y. Wang W. Personality traits in migraine and tension-type headaches: a five-factor model study. *Psychopathology* 2002; 35: 254-258.
 - 6- Wolf HG. Personality features and reactions of subjects with migraine. *Arch Neurol Psychiatry* 1937; 37: 895-921.
 - 7- Stewart WF. Linet MS. Celentano DD. Migraine headache and panic attacks. *Psychosom Med* 1989; 51: 559-569.
 - 8- Mattsson P. Ekselius L. Migraine, major depression, panic disorder, and personality traits in women aged 40-74 years: a population-based study. *Cephalalgia* 2002; 22: 543-551.
 - 9- Nikiforo R. Hokkanen E. An epidemiological study of headache in an urban and a rural population in Northern Finland. *Headache* 1978; 18: 137-145.
 - 10- Stochino ME. Asuni C. Congiu D. Del Zompo M. Severino G. Association study between the phenotype migraine without aura-panic disorder and dopaminergic receptor genes. *Pharmacol Res* 2003; 48: 531-534.
 - 11- Peroutka SJ. Price SC. Wilhoit TL. Jones KW. Comorbid migraine with aura, anxiety, and depression is associated with dopamine D2 receptor (DRD2) NcoI alleles. *Mol Med* 1998; 4: 14-21.
 - 12- Kessler RC. McGonagle KA. Zhao S. Nelson CB. Hughes M. Eshleman S. et al. Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Results from the National Comorbidity Survey. *Arch Gen Psychiatry* 1994; 51: 8-19.
 - 13- Juang KD. Wang SJ. Fuh JL. Lu SR. Su TP. Comorbidity of depressive and anxiety disorders in chronic daily headache and its subtypes. *Headache* 2000; 40: 818-823.
 - 14- Finlay-Jones R. Brown GW. types of stressful life event and the onset of anxiety and depressive disorders. *Psychol Med* 1981; 11: 803-815.
 - 15- Headache Classification Committee of the International Headache Society: Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. *Cephalalgia* 1988; 8: 19.
 - 16- Diagnostic and statistical manual of mental disorders (1994), 4th ed, American Psychiatric Association, Washington D.C.
 - 17- Regina A. Shih. Pamela L. Belmonte and Peter P. Zandi. A review of the evidence from family, twin and adoption studies for a genetic contribution to adult psychiatric disorders. *Int RevPsychiatry* 2004; 16: 260-283.
- ۱۸- کاویانی حسین، احمدی ابهری سیدعلی، دهقان محمد، منصورنیا محمدعلی، خرمشاهی مازیار، قدیرزاده محمدرضا، دادبی علیرضا، چهاردهی امیر. شیوع اختلال‌های اضطرابی در شهر تهران. *فصلنامه اندیشه و رفتار* ۱۳۸۱: دوره ۸، شماره ۳: صفحات ۴ تا ۱۱.
- 19- Ossipova VV. Kolosova OA. Vein AM. Migraine associated with panic attacks. *Cephalalgia* 1999; 19: 728-731.