

Characterization and expression of GRA7 gene of *Toxoplasma gondii* RH strain in eukaryotic pcDNA3 plasmid

Vazini H¹, Ghaffarifar F^{1*}, Sharifi Z², Dalimi-Asl A¹

1- Department of Parasitology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, I. R. Iran.

2- Department of Virology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, I. R. Iran.

Received January 18, 2012; Accepted June 13, 2012

Abstract:

Background: Toxoplasmosis, as a widespread and important disease, can cause severe complications in the congenital and HIV cases. Vaccination is one of the preventive approaches in humans and domestic animals. The GRA7, an excretory 29 kDa *Toxoplasma gondii* dense granule antigen released by the infected host cells, has been considered as a candidate to produce a vaccine.

Materials and Methods: In this experimental study, the inserted plasmid containing GRA7 gene was extracted from TOP10 bacteria and digested with the BamH1 and EcoR1 enzymes. The isolated gene was inserted into the pcDNA3 plasmid. The cloning was confirmed by the PCR and sequencing. The protein expression was confirmed by the SDS-PAGE and Western blotting.

Results: The results showed that the GRA7 gene was cloned into the pcDNA3 plasmid. The isolated gene cloned in pcDNA3 was confirmed by PCR and showed the 733bp band. The pcGRA7 plasmid expressed in the CHO cells showed the 29 kDa band using the SDS-PAGE and Western blotting.

Conclusion: Considering that cloning of GRA7 gene has been done in the pcDNA3 plasmid and transformed in the eukaryotic cells, it can be used for the DNA vaccine researches.

Keywords: *Toxoplasma gondii* RH strain, Cloning, pc-GRA7, Eukaryotic pcDNA3 plasmid

* Corresponding Author.

Email: ghafarif@modares.ac.ir

Tel: 0098 21 828 84553

Fax: 0098 21 828 84555

Conflict of Interests: No

Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences March, 2013; Vol. 17, No 1, Pages 8-13

Please cite this article as: Vazini H, Ghaffarifar F, Sharifi Z, Dalimi-Asl A. Characterization and expression of GRA7 gene of *Toxoplasma gondii* RH strain in eukaryotic pcDNA3 plasmid. *Feyz* 2013; 17(1): 8-13.

شناختی و بیان ژن GRA7 توکسوپلاسما گوندهای سویه RH در پلاسمید یوکاریوت pcDNA3 بیانی

حسین وزینی^۱، فاطمه غفاری فر^{۲*}، زهره شریفی^۳، عبدالحسین دلیمی اصل^۴

خلاصه:

سابقه و هدف: توکسوپلاسموزیس از بیماری‌های شایع جهان است و بیشتر به علت عوارض و خیمی که در موارد مادرزادی و بیماران مبتلا به ایدز ایجاد می‌کند، اهمیت دارد. یکی از راه‌های پیشگیری از این انگل در انسان و دام استفاده از واکسن می‌باشد. آنتی ژن گرانولی ۷ (GRA7) یک آنتی ژن فشرده ترشحی ۲۹ کیلو Daltonی توکسوپلاسما گوندهای می‌باشد که در واکوئل پارازیتوفروس تولید شده، توسط سلول‌های آلوه میزان آزاد می‌شود و به عنوان کاندیدای تهیه واکسن مطرح می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی پلاسمید حاوی ژن GRA7 از باکتری TOPO استخراج شد. سپس این پلاسمید با آنزیم‌های EcoR1 و BamH1 برش داده شد. ژن جدا شده وارد پلاسمید pcDNA3 گردید. این کلوبینگ با روش‌های PCR و تعیین توالی تایید شد. بیان پروتئین نیز با روش‌های SDS-PAGE و وسترن بلات تایید شد.

نتایج: تتابع نشان داد که ژن GRA7 در پلاسمید pcDNA3 کلون شده است و تتابع PCR پلاسمید حاوی ژن GRA7 قطعه ۷۳۳ bp را نشان داد. بیان pcGRA7 در سلول‌های CHO با استفاده از روش‌های SDS-PAGE و وسترن بلات باند ۲۹ کیلو Daltonی را نشان داد.

نتیجه‌گیری: تتابع حاصل نشان داد که کلوبینگ ژن GRA7 در پلاسمید pcDNA3 انجام شده و پلاسمید نوترکیب در سلول‌های یوکاریوتیک بیان گردیده است لذا، قابلیت آن را دارد که برای تحقیقات تهیه واکسن DNA استفاده شود.

واژگان کلیدی: سویه RH توکسوپلاسما گوندهای، کلوبینگ، ژن GRA7، پلاسمید یوکاریوتیک، pcDNA3

دو ماهنامه علمی-پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره ۱، فوریه و اردیبهشت ۱۳۹۲، صفحات ۸-۱۳

مقدمه

در اکثر افراد سالم، این بیماری قادر علائم بالینی است، اما در افرادی که دچار نقص سیستم ایمنی هستند افراد مبتلا به ایدز [۱]، گیرندهای پیوند عضو و بیماران سرطانی حائز اهمیت می‌باشد و مسبب عوارض شدید و گاه کشنده می‌شود. در خانم‌های باردار این انگل می‌تواند باعث عوارض شدید عصبی یا چشمی در چنین شده و حتی می‌تواند سقط جنین را سبب شود [۲]. از آنجایی که این انگل دارای میزان متعادل است و باعث سقط جنین در دام‌های اهلی نیز می‌گردد، بنابراین در صنعت دامپروری نیز حائز اهمیت بوده و باعث خسارات اقتصادی قابل توجهی می‌شود. به دلایل اهمیت پزشکی و دامپزشکی این بیماری تهیه واکسن مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است [۲]. مطالعات و تجربیات مختلف نشان داده است که احتمال تهیه واکسنی مناسب علیه توکسوپلاسموزیس انسانی وجود دارد [۳]. در سال‌های گذشته، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در جهت ایجاد و گسترش واکسنی مؤثر برای بیماری توکسوپلاسموزیس به وجود آمده است و واکسنی با استرین ژنده ضعیف شده S48 برای مصارف دامپزشکی تهیه شده است. در عین حال این واکسن ممکن است به حالت بیماری زا برگردد؛ از این‌رو برای مصرف انسانی مناسب نیست [۴]. آنتی ژن‌های دفعی ترشحی از مهم‌ترین آنتی ژن‌های توکسوپلاسما

توکسوپلاسموزیس به وسیله انگل تک یاخته داخل سلولی به نام توکسوپلاسما گوندهای ایجاد می‌شود که در سراسر جهان انتشار دارد. از لحاظ پزشکی و دامپزشکی این بیماری دارای اهمیت بوده و عامل بیماری مادرزادی در انسان و حیوانات اهلی است [۱]. علاوه بر این، به تازگی به دلیل بروز آنسفالیت در افراد ایدزی به اهمیت آن افزوده شده است [۱]. این انگل علاوه بر انسان، تعداد زیادی از حیوانات پستاندار و هم‌چنین گونه‌های مختلف پرندگان را آلوه می‌سازد.

دانشجوی دکتری، گروه انگل‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

۲ دانشیار، گروه انگل‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

۳ دانشیار، گروه ویروس‌شناسی، مرکز تحقیقات موسسه عالی آموزشی پژوهشی طب انتقال خون

۴ استاد، گروه انگل‌شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

*نشانی نویسنده مسئول:

تهران، تقاطع بزرگراه آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی، گروه انگل‌شناسی پزشکی

تلفن: ۰۲۱ ۸۲۸۸۴۵۵۵، ۰۲۱ ۸۲۸۸۴۵۵۳، ۰۲۱ ۸۲۸۸۴۵۵۵

پست الکترونیک: ghafarif@modares.ac.ir

تاریخ دریافت: ۹۰/۱۰/۲۸ تاریخ پذیرش نهایی: ۹۱/۳/۲۴

pT-GRA7 جدا شد. برش آنزیمی پلاسمید نوترکیب pTGRA7 و پلاسمید pcDNA3 با استفاده از آنزیمهای EcoR1 و BamH1 درصد مشاهده گردید. کلوزینیگ ژن GRA7 در پلاسمید pcDNA3 بر اساس دستورالعمل کیت شرکت Fermentas انجام گردید. انتقال پلاسمیدهای کلون شده داخل ناکل TOP10 بر اساس دستورالعمل گفته شده در قسمت بالا انجام گردید [۹]. برای غربال کردن کلونیهای باکتری حاوی پلاسمید نوترکیب pcGRA7 مقدار ۳۰۰ میکرولیتر از باکتری‌های ترانسفورم شده را روی محیط LB آگار حاوی آنتی بیوتیک آمپی-سیلین ریخته و با کمک میله شیشه‌ای روی محیط پخش گردید؛ به نحوی که تمام مایع روی سطح محیط را فرا گرفت. سپس پلیت‌ها یک شب درون انکوباتور C ۳۷° قرار داده شدند. باکتری‌های قادر به رشد روی محیط حاوی آمپی‌سیلین هستند که پلاسمید نوترکیب را دریافت کرده باشند [۹]. یکی از راههای تأیید کردن کلون شدن قطعه GRA7 در پلاسمید بیانی pcDNA3، استخراج پلاسمیدهای pcDNA3 و pcGRA7 از باکتری‌های ترانسفورم شده می‌باشد. پلاسمیدهای استخراج شده روی ژن آگاروز ۰/۸ درصد الکتروفورز شدند. پلاسمیدهای pcGRA7 چون حاوی قطعه مورد نظر هستند، سنتگین تر می‌باشند (شکل شماره ۱). هم‌چنین، ژن GRA7 با استفاده از پلاسمید نوترکیب pcGRA7 به عنوان الگو با استفاده از پرایمرهای اختصاصی روی پلاسمید نوترکیب PCR گردید. پرایمرهای به کار رفته (تهیه شده توسط شرکت سیناژن) در این PCR عبارتند از:

F: GCG GGATCC TTT GCC CCA GTT CGC
TAC CG
(29nt, underlined sequence contains BamHI
restrictin site)

R: CGC GAATTCT CCT GGC GGG CAT CCT
CCC CAT C
(31nt, underlined sequence contains EcoR1
restrictin site).


روش کار PCR طبق برنامه انجام شده با دستگاه ترموسایکلر اپندورف و برنامه در تحقیقات قبلی می‌باشد [۸]. به طور خلاصه این برنامه بدین ترتیب می‌باشد، زمان دناتوره اولیه در ۹۴ درجه سانتی‌گراد ۵ دقیقه (Denaturation) در ۹۴ درجه سانتی‌گراد ۱ دقیقه، ۵۰ درجه سانتی‌گراد ۳۰ ثانیه، Extension در ۹۲ درجه سانتی‌گراد ۱ دقیقه ۵ سیکل (Denaturation) در ۹۴ درجه سانتی‌گراد ۱ دقیقه، Annealing در ۹۲ درجه سانتی‌گراد ۱ دقیقه ۵۴ درجه سانتی‌گراد ۳۰ ثانیه، Extension در ۹۲ درجه سانتی‌گراد ۱ دقیقه ۵ Final Extension در ۷۲ °C می‌باشد. برای بیان ژن GRA7 در محیط کشت سلولی در این تحقیق از سلول

گوندهای می‌باشد که هم در زمینه واکسن و هم در زمینه تشخیص کاربرد دارند. از میان آنتی‌ژن‌های دفعی ترشحی، آنتی‌ژن‌های گرانولی فشرده از اهمیت خاصی برخوردارند. در این میان آنتی‌ژن گرانولی شماره ۷ یا GRA7 از جمله آنتی‌ژن‌های مهمی محسوب می‌شوند که هم در زمینه تشخیص و هم اینمنی‌زایی به کار برده می‌شوند [۵]. ژن GRA7 پروتئین ۲۹ کیلو Daltonی را کد می‌کند که این پروتئین توسط سلول‌های میزبان این انگل ترشح می‌شود. در سلول‌های آلووه به تاکی‌زوئیت‌ها تجمع این پروتئین در واکوئل پارازیتوفروز (Parasitophorous vacuole) صورت می‌گیرد. در سلول‌های آلووه به برادی‌زوئیت‌ها در سیتوپلاسم سلولی حضور دارد و به وسیله روش ایمونوفلورسانس قابل شناسایی است. به علاوه در محیط‌های کشت سلولی حاوی کیست که فاقد انگل خارج سلولی هستند، در محلول رویی این محیط‌های کشت سلولی پروتئین ۲۹ کیلو Daltonی با استفاده از روش الیزا (Enzyme-Linked Innumosorbent Assay: ELISA) قابل شناسایی است. از طرف دیگر، این آنتی‌ژن با وزن مولکولی ۲۹ کیلو Dalton بسیار ایمونوژن بوده و یکی از کاندیداهای تهیه واکسن است [۷،۶]. هدف از این مطالعه کلون کردن قطعه ژن GRA7 در پلاسمید یوکاریوت بیانی pcDNA3 و ترانسفورم این پلاسمید نوترکیب، در باکتری E.coli سوش TOP10 و بیان آن در سلول‌های یوکاریوت به منظور تهیه واکسن DNA می‌باشد. این تحقیق در سال ۱۳۹۰ و در دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها


طراحی مطالعه در این تحقیق از نوع تجربی می‌باشد.

در این مطالعه از باکتری TOP10 حاوی پلاسمید نوترکیب ۷ pT-GRA7 که قبلاً در گروه انگل شناسی تهیه شده بود، استفاده شد [۸]. به منظور تعیین توالی پلاسمیدهای نوترکیب از کلونی‌های سفید استخراج گردیدند (اگر X-gal همراه با یک القاء کننده آنزیم یعنی ایزوپروپیل تیوگالاکتوپیرانوزید (IPTG) و آمپی‌سیلین به آگار اضافه شود، کلونی‌های فاقد پلاسمید نوترکیب که در آنها بتا گالاکتوزیداز سنتز می‌شود به رنگ آبی در می‌آیند، در حالی که کلونی‌های حاوی پلاسمید نوترکیب چون قادر به ساخت بتا گالاکتوزیداز نمی‌باشند، به رنگ سفید خواهند بود) و به شرکت ژن فن آوران فرستاده شد. سپس نتایج تعیین توالی بلاست RH. از نظر تشابهات و اختلاف با ژن GRA7 سویه RH استاندارد توکسوپلاسمای گوندهای در بانک ژنی مقایسه شد. جهت ساب کلونینیگ با استفاده از برش آنزیمی قطعه GRA7 از پلاسمید



شکل شماره ۲- الکتروفورز محصول PCR روی ژل آگاروز ۱ درصد، ستون شماره ۱ قطعه GRA7 اندازه ۷۳۳ جفت باز، ستون ۲ مارکر ۱۰۰ جفت باز DNA

برش آنزیمی پلاسمید pTGRA7 با آنزیم‌های EcoRI و BamHI باعث جدا شدن قطعه مورد نظر به اندازه ۷۳۳ جفت بازی می‌باشد که هماندازه ژن GRA7 توکسوپلاسما گوندهای و باند دیگر تقریباً هماندازه pTZ57R بود. بنابراین نتایج برش آنزیمی روی ژل آگاروز، کلون ژن GRA7 درون پلاسمید pTZ57R را نشان داد (شکل شماره ۳).




شکل شماره ۳- نتایج برش آنزیمی پلاسمید نوترکیب PTZ-GRA7 روی ژل آگاروز ۰/۸ درصد، ستون ۱ و ۳ مارکر ۱۰۰ جفت بازی، ستون ۲ پلاسمید pcGRA7 آنزیم خورده، ستون ۴ پلاسمید-PTZ آنزیم خورده و قطعه ۷۳۳ جفت بازی از قطعه GRA7 ۲۸۸۶ bp جدا شده است.

نتایج حاصل از تعیین توالی ژن GRA7 در پلاسمید pTZ57R نشان داد که این ژن با ژن GRA7 توکسوپلاسما گوندهای دارای شماره Y-13863 در بانک ژنی حدود ۹۹ درصد تشابه دارد. در این مطالعه نتایج SDS-PAGE نشان داد که پروتئین‌های بارگذاری شده براساس وزن مولکولی جدا شده‌اند و باندهایی با وزن‌های مولکولی در محدوده ۲۹ کیلو Dalton دیده می‌شود؛ به-

(Chine's Hamster Ovary) CHO سلول یوکاریوتیک به کار گرفته شد و به عنوان میزبان پلاسمید کد کننده ژن GRA7 استفاده گردید. در این مطالعه تجربی از دو نوع پلاسمید استفاده شد؛ در یک گروه از پلاسمید به عنوان گروه مورد و از پلاسمید pcDNA3 به عنوان گروه شاهد برای ترانسفکت کردن در سلول‌های CHO استفاده شد. GRA7 پلاسمید یوکاریوتیک بیانی pcDNA3 که حامل ژن GRA7 می‌باشد، چنانچه در محیط کشت سلولی قرار گیرد می‌تواند از امکانات رونوشت برداری و ترجمه سلول یوکاریوتیک استفاده نماید و پروتئین GRA7 بیان شود. برای این منظور از کیت ترانسفکت genejuice شرکت Novagen استفاده گردید و مطابق با روش کار شرکت سازنده انجام شد. برای بررسی بیان پروتئین GRA7 در محیط کشت سلول‌های ترانسفکت شده است که این امر از طریق استخراج پروتئین و روش‌های SDS-PAGE و Western blot انجام شد [۱۱، ۱۰].

نتایج

برای تایید کلون مورد نظر، باند پلاسمیدهای pcDNA3 و پلاسمید نوترکیب pcGRA7 استخراج شده روی ژل آگاروز ۰/۸ درصد الکتروفورز شدند (شکل شماره ۱).




شکل شماره ۱- مقایسه پلاسمیدهای استخراج شده pcDNA3 و pcGRA7، ستون ۱: pTZ57R، ستون ۲: pcGRA7، ستون ۳: pDNA3، ستون ۴: مارکر ۱۰۰ جفت باز، ستون ۵: pGRA7

نتایج PCR به کمک DNA ژنومی بدین ترتیب است که محصول PCR به صورت یک باند ۷۳۳ جفت بازی می‌باشد که با قطعه GRA7 مورد نظر مطابقت دارد (شکل شماره ۲).


در پلاسمید pTZ57R با BLAST کردن در پایگاه اینترنی NCBI مورد آنالیز قرار گرفت و نشان داد که قطعه ۷۳۳ جفت RH بازی در این پلاسمید کلون شده است. این ژن با سویه DQ459443.2 در بانک توکسوپلاسما گوندهای دارای شماره ۹۹ درصد متشابه است که این شباهت نشان دهنده حفظ توالی ژن در سویه های مختلف انگل است. در برش آنزیمی پلاسمید pcGRA7 قطعه ۷۳۳ جفت بازی جدا گردید که نشان دهنده کلون شدن این ژن در این پلاسمید بیانی می باشد. نتایج PCR روی پلاسمیدها وجود دارد. از این پلاسمید می توان جهت تهیه واکسن های نوترکیب علیه بیماری های انگلی استفاده نمود. آنتی ژن های دفعی ترشحی توکسو پلاسما گوندهای از مهمترین آنتی ژن های به کار رفته هم در زمینه واکسن و هم در زمینه تشخیص می باشند. از میان آنتی ژن های دفعی ترشحی آنتی ژن های گرانولی فشرده از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این میان آنتی ژن گرانولی شماره ۷ یا GRA7 از جمله آنتی ژن های مهمی محسوب می شوند که مخصوصا در زمینه تشخیص به کار برد می شوند. ژن GRA7 پروتئین ۲۹ کیلو دالتونی را کد می کند که این پروتئین توسط سلول های میزان این انگل ترشح می شود [۱۲]. پروتئین ۲۹ کیلو دالتونی GRA7 هنگامی که همراه با پروتئین های ۳۰ و ۳۵ کیلو دالتونی استفاده شود، برای تشخیص موارد IgG مثبت به کار می رود و زمانی که با پروتئین های ۳۵ و ۶۶ به کار برد می شود برای تشخیص موارد IgM مثبت به کار می رود [۱۲]. به کار گیری ژن GRA7 برای تهیه آنتی ژن نوترکیب جهت تشخیص از کاندیداهای اصلی برای تشخیص توکسوپلاسموز می باشد. استفاده از این آنتی ژن برای تشخیص بیماری توکسوپلاسموزیس به خصوص در موارد خطرناک کشنده در بیماران مبتلا به ایدز و توکسوپلاسموزیس مادرزادی بسیار اهمیت دارد [۱۳]. هم چنین، به کار گیری این ژن برای تهیه واکسن نیز از موارد مهم برای تحریک سیستم ایمنی میزان این برای مقابله با بیماری توکسوپلاسموزیس می باشد. Jacobs و همکاران در سال ۱۹۹۹ به ارزیابی آنتی ژن نوترکیب GRA7 جهت شناسی IgG پرداختند. آنها این ژن را وارد و وکتور بیانی PmTNFMPH کردن. آنتی ژن پروتئینی بیان شده دارای ۲۷۲ اسید آمینه و وزن مولکولی ۲۹/۸۴۶ کیلو دالتون بود. کاربرد این پروتئین نوترکیب برای تشخیص توکسوپلاسموزیس با روش الیزای غیر مستقیم دارای ۸۱ درصد حساسیت و ۹۸ درصد اختصاصیت بود، یعنی این آنتی ژن قادر به تحریک سیستم ایمنی می باشد و برای تشخیص مناسب می باشد [۱۴]. برخی مطالعات مشابه نیز از این ژن به عنوان DNA واکسن

طوری که در ستون مربوط به چاهک های سلولی که با پلاسمید ترانسفکت شده بودند، در این ناحیه باند اضافی وجود دارد که در ستون های کنترل وجود ندارد.



شکل شماره ۴- باندهای به دست آمده از SDS-PAGE (ژل درصد) برای پروتئین های استخراج شده از سلول های ترانسفکت شده با پلاسمید pcGRA7 و سلول های کنترل. ستون ۱: سلول CHO ترانسفکت شده با pcDNA3، ستون ۲: سلول CHO ترانسفکت شده با pcGRA7 پس از ۴۸ ساعت، ستون ۳: سلول CHO ترانسفکت شده با pcGRA7 پس از ۷۲ ساعت و M مارکر.

در شکل شماره ۵ نتایج وسترن بلات نشان داد بین پروتئین های استخراج شده از چاهک های ترانسفکت شده با پلاسمید pcGRA7 (ستون ۲ و ۳) باند پروتئینی با وزن مولکولی حدود ۲۹ کیلو دالتون وجود دارد که در چاهک کنترل (ستون ۱) وجود ندارد. تشکیل این باند در روی کاغذ نیتروسلولز نشان دهنده شناسایی پروتئین GRA7 به وسیله سرم انسانی ضد توکسوپلاسمایی می باشد.



شکل شماره ۵- کاغذ نیتروسلولزی که پروتئین های تفکیک شده در مرحله SDS-PAGE به آن منتقل شده نشان داده شده است. M: پروتئین مارکر، ستون ۱: سلول CHO ترانسفکت شده با pcDNA3، ستون ۲: سلول CHO ترانسفکت شده با pcGRA7 پس از ۴۸ ساعت، ستون ۳: سلول CHO ترانسفکت شده با pcGRA7 پس از ۷۲ ساعت.

بحث

در این تحقیق توالی ژن GRA7 توکسوپلاسما گوندهای

ایمونوژن می‌باشد، لذا قابلیت آن را دارد که برای تحقیقات تهیه واکسن DNA استفاده شود.

استفاده کرده‌اند که هم به صورت مجرا و هم کوکتل در برابر بیماری توکسoplasmozیس محافظت نسبی ایجاد کرده است [۱۶، ۱۵، ۵].

تشکر و قدردانی

این تحقیق در قالب بخشی از رساله دکتری تخصصی رشته انگل شناسی پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس و با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام شده است.

نتیجه‌گیری

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که کلونینگ ژن GRA7 در پلاسمید pcDNA3 انجام شده است و پلاسمید نوترکیب در سلول‌های یوکاریوتیک بیان شده و پروتئین ۲۹ کیلو Daltonی تولید شده است. نتایج وسترن بلات نیز نشان می‌دهد که این آنتی ژن

References:

- [1] Daryani A, Sharif M, Meigouni M. Seroprevalence of IgG and IgM anti—*Toxoplasma* antibodies in HIV/AIDS patients, northern Iran. *Asian Pacific J Tropical Med* 2011; 4(4): 271-4.
- [2] Dubey JP, Beattie CP. Toxoplasmosis of animals and man. CRC press, Inc Boca Raton, 1988; FL, p 220.
- [3] Bhopale GM. Development of a vaccine for toxoplasmosis: current status. *Microbiol Infect* 2003; 5: 457-62.
- [4] Saito S, Aosai F, Rikihisa N, Mun H, Norose K, et al. Establishment of gene-vaccinated skin grafting against *Toxoplasma gondii* infection in mice. *Vaccine* 2001; 19: 2172-80.
- [5] Jongert E, Melkebeek V, De Craeye S, Dewit, J, Verhelst D, Coxd E. An enhanced GRA1—GRA7 cocktail DNA vaccine primes anti-*Toxoplasma* immune responses in pigs. *Vaccine* 2008; 26: 1025-31.
- [6] Bonhomme A, Maine GT, Beorchia A, Burlet H, Aubert D, et al. Quantitative immunolocalization of a P29 protein (GRA7), a new antigen of *Toxoplasma gondii*. *J Histochem Cytochem* 1998; 46: 1411–22.
- [7] Fischer HG, Stachelhaus S, Sahm M, Meyer HE, Reichmann G. GRA7, an excretory 29 kDa *Toxoplasma gondii* dense granule antigen released by infected host cells. *Mol Biochem Parasitol* 1998; 91(2): 251-62.
- [8] Ghaffarifar F, Rahmah N, Sharifi Z, Dalimi A, Roudbar Mohammadi Sh, Ghasemi S. Cloning and sequencing of Granular antigen 7 of *Toxoplasma gondii*. *Modarres J Med Sci* 2008; 11(3): 73-80.
- [9] Sambrook J, Russell DW. *Molecular cloning: A laboratory manual*, Third Edition. Plainview: Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2001.
- [10] Laemmli UK. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature* 1970; 227: 680-5.
- [11] Dunbar BS. Protein blotting: A practical approach. Ed. Oxford University Press; 1994.
- [12] Nigro M, Gutierrez A, Hoffer AM, Clemente M, Kaufer F, et al. Evaluation of *Toxoplasma gondii* recombinant proteins for the diagnosis of recently acquired Toxoplasmosis by an immunoglobulin G analysis. *Diagn Microbiol Infect Disease* 2003; 47: 609-13.
- [13] Cursons, R.T. DIG-ELISA for the serologic diagnosis of Toxoplasmosis. *Am J Clin Path* 1982; 77(4): 459-61.
- [14] Jacobs D, Vercammen M, Saman E. Evaluation of recombinant dense granule antigen 7 (GRA7) of *Toxoplasma gondii* for detection of immunoglobulin G antibodies and analysis of a major antigenic domain. *Clin Diagn Lab Immunol* 1999; 6: 24-9.
- [15] Jongert E, de Craeye S, Dewit J, Huygen, K, 2007. GRA7 provides protective immunity in cocktail DNA vaccines against *Toxoplasma gondii*.
- [16] Fachado A, Rodriguez A, Angel SO, Pinto DC, Vila I, et al. Protective effect of a naked DNA vaccine cocktail against lethal Toxoplasmosis in mice. *Vaccine* 2003; 21: 1327-35.