

Prevalence of vancomycin-resistant enterococcus strains in fecal samples isolated from ICU patients in Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2011-2012

Jabbari-Shiade SM¹, Moniri R^{2,3*}, Khorshidi A³, Saba MA⁴, Mousavi GA⁵, Salehi M¹

1- Student Research Committee, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R, Iran.

2- Anatomical Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R, Iran.

3- Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R, Iran.

4- Physiology Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R, Iran.

5- Trauma Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R, Iran.

Received January 23, 2012; Accepted June 2, 2013

Abstract:

Background: Vancomycin-resistant enterococci (VRE) are the important nosocomial pathogens worldwide. The aim of this study was to identify the prevalence of VRE strains in fecal samples isolated from ICU patients and the associated risk factors.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 156 fecal samples were collected from three sectors of ICU at Kashan Shahid-Beheshti hospital from November 2011 to April 2012. Enterococci were detected in samples using the Gram stain and biochemical tests such as catalase reaction, pyrro-lidonyl arylamidase (PYR) and hydrolyze bile esculin. Antibiotic sensitivity test was done by Kirby-Bauer method for the detection of phenotypic resistance.

Results: Fifty-eight out of 135 (43%) patients were colonized with VRE. Van A, B and C phenotypes were 79.3%, 17.2% and 3.5%, respectively. Ninety-four percent of VRE-positive patients had used antibiotics ($P=0.037$). VRE colonization was associated with the use of 3-4 types of antibiotics (59.2%) and 1-2 types of antibiotics (35.4%; $P=0.009$) and also with prolonged hospitalization. Moreover, no significant association was seen between VRE colonization and the use of corticosteroids, diabetes, history of hospitalization and the type of diseases.

Conclusion: The risk factors for VRE colonization were the use of antibiotics, especially using 3-4 types of antibiotics and prolonged hospitalization.

Keywords: Vancomycin-resistant entroccocus, ICU, Rectum

* Corresponding Author.

Email: moniri@kaums.ac.ir

Tel: 0098 913 361 2636

Fax: 0098 361 555 1112

Conflict of Interests: No

Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences November, 2013; Vol. 17, No 5, Pages 482-487

Please cite this article as: Jabbari-shiade SM, Moniri R, Khorshidi A, Saba MA, Mousavi GA, Salehi M. Prevalence of vancomycin-resistant enterococcus strains in fecal samples isolated from ICU patients in Kashan Shahid-Beheshti hospital during 2011-2012. *Feyz* 2013; 17(5): 482-7.

بررسی شیوع سویه‌های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین (VRE) در نمونه‌های مذفوع جدا شده از بیماران بستری در ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱

سیده مرضیه جباری شیاده^۱، رضوان منیری^{۲*}، احمد خورشیدی^۴، محمدعلی صبا^۵، سید غلامعباس موسوی^۶، مهدی صالحی^۷

خلاصه:

سابقه و هدف: انتروکوک مقاوم به ونکومایسین از پاتوژن‌های مهم بیمارستانی در جهان است. هدف از این مطالعه شناسایی شیوع انتروکوک مقاوم به ونکومایسین در سویه‌های انتروکوک جدا شده از سواب رکتال بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان و فاکتورهای خطر آن بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی از آبان ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱ در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام پذیرفت. ۱۵۶ نمونه سواب رکتال از بیماران بستری در سه بخش مراقبت ویژه جمع‌آوری گردید. نمونه‌ها از نظر وجود انتروکوک با انجام رنگ آمیزی گرم، تست‌های بیوشیمیایی مانند کاتالاز، هیدرولیز پپرولیدونیل بتا-نفتیل آمید و ایجاد کلونی‌های سیاهرنگ روی بایل اسکولین آزید تایید شدند. تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی به روش کربی با برای تشخیص مقاومت انجام شد.

نتایج: شیوع انتروکوک مقاوم به ونکومایسین ۵۸ مورد (۴۳ درصد) VanA و ۷۹/۳ VanB بود. فنوتیپ VanC ۱۷/۲ درصد، VanC ۳/۵ درصد بود. بین ناقل VRE و مصرف آنتی‌بیوتیک ارتباط معنی‌دار مشاهده شد ($P=0.037$) و ۹۴/۸ درصد افراد با کلونیزاسیون انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین سابقه مصرف آنتی‌بیوتیک داشتند و این ارتباط در مصرف ۳-۴ نوع آنتی‌بیوتیک (۵۹/۲ درصد) نسبت به ۱-۲ آنتی‌بیوتیک (۳۵/۴ درصد) ($P=0.009$) و با مدت زمان بستری در بیمارستان (۰-۱۰۰۹) ارتباط معنی‌داری نشان داد. بین کلونیزاسیون VRE و مصرف کورتون، وجود دبایت، سابقه بستری و نوع آنتی‌بیوتیک و افزایش طول مدت بستری در بیمارستان بود.

وازگان کلیدی: انتروکوک مقاوم به ونکومایسین (VRE)، بخش مراقبت ویژه، رکتوم

دو ماهنامه علمی-پژوهشی فیض، دوره هفدهم، شماره ۵، آذر و دی ۱۳۹۲، صفحات ۴۸۷-۴۸۲

بیش از ۳۰ گونه متفاوت از انتروکوک‌ها شناسایی شده‌اند، اما بیشتر این عفونت‌ها به‌وسیله گونه‌های انتروکوک فکالیس و انتروکوک فسیوم ایجاد می‌شود [۴]. آنتی‌بیوتیک‌های زیادی شامل بتالاکتام‌ها، ماکرولیدها، آمینوگلیکوزیدها و گلیکوپیتیدها برای درمان عفونت‌های انتروکوکی استفاده می‌شوند [۵]، ولی به‌دلیل گسترش سویه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک، امروزه داروی انتخابی برای درمان عفونت‌های انتروکوکی مقاوم، ونکومایسین است [۶]. این دارو یکی از آنتی‌بیوتیک‌هایی است که به عنوان خط آخر در درمان عفونت با باکتری‌های گرم مثبت مقاوم به دارو مصرف می‌شود [۷]. اولین انتروکوک مقاومت به ونکومایسین در سال ۱۹۸۶ در فرانسه مشاهده شد [۹]. پس از آن سویه‌های VRE به کشورهای دیگر گسترش یافته‌اند [۱۰-۱۳]. انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین (VRE) ژن مقاومت را با خود حمل می‌کنند و متابع اصلی عفونت در انسان می‌باشند [۱۷-۱۴]. انتروکوک‌ها دارای مقاومت ذاتی به سفالوپپورین‌ها و برخی پنی‌سیلین‌ها می‌باشند و شیوع مقاومت به آمینوپنی‌سیلین‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های گلیکوپیتیدی یعنی ونکومایسین و تیکوپلانین یکی از نگرانی‌های بهداشتی در سال‌های اخیر بوده است [۱۸]: چون آنتی‌بیوتیک‌های موثر در

مقدمه

انتروکوک‌ها بخشی از فلور روده انسان و حیوانات و یکی از علل مهم عفونت‌های بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان می‌باشند [۲،۱]. این جنس از باکتری‌ها به عنوان سومین عامل شایع باکتریومی بیمارستانی مطرح می‌باشد [۳].

۱ دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۲ استاد، مرکز تحقیقات علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۳ استاد، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۴ دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۵ استاد دیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۶ مریبی، مرکز تحقیقات ترومای، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۷ کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

* لشائی نویسنده مسئول؛

کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز

تحقیقات علوم تشریح

دوفنیس: ۰۳۶۱۵۵۵۱۱۱۲.

پست الکترونیک: moniri@kaums.ac.ir

تاریخ پذیرش نهایی: ۹۲/۳/۱۲

تاریخ دریافت: ۹۱/۱۱/۴

نمونه‌گیری در شرایط استریل در محیط مایع نمک ۶/۵ درصد استریل (Merck) به آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده انتقال داده شدند و پس از ۶ ساعت گرمادهی در انکوباتور ۳۷ درجه سانتی‌گراد، روی محیط بایل اسکولین آزید (Bile Aesculin Merck) (Azide Agar) کشت داده شدند. بعد از ۲۴ ساعت انکوباسیون در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد کلونی‌های سیاهرنگ انتروکوک حاصل از علت توانایی هیدرولیز اسکولین و رشد در مجاورت صفرا تشخیص داده شدند. جهت تایید تشخیص از رنگ آمیزی گرم و تست‌های بیوشیمیایی کاتالاز، هیدرولیز L-پپرولیدونیل بتا نفتیل آمید استفاده گردید. برای آنتی‌بیوگرام از روش دیسک دیفیوژن طبق معیار CLSI استفاده گردید. بعد از کشت، دیسک‌های ۳۰ میکروگرمی و نکومایسین (Mast, UK) و ۳۰ میکروگرمی تیکوپلانین (Mast, UK) بر روی محیط کشت قرار داده شد. سپس، به مدت ۲۴ ساعت پلیت‌ها در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انکوبه گردید. نتایج تست آنتی‌بیوگرام بر اساس سایز هاله عدم رشد و طبق استاندارد CLSI قرائت و تفسیر گردید. این استاندارد، هاله عدم رشدی که نشان‌گر مقاومت باشد را مساوی یا کمتر از ۱۴ برای ونکومایسین و مساوی یا کمتر از ۱۰ برای تیکوپلانین تعريف کرده است. برای ATCC 51299 به عنوان کنترل مثبت در این مطالعه استفاده گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۶ و در سطح معنی‌داری ۰/۰۵ و با استفاده از آزمون‌های مجذور کای و دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج

از ۱۵۶ نمونه در دسترس سواب رکتال جدا شده از بیماران بستری در سه بخش مراقبت ویژه ۱۳۵ سویه ۸۶/۵ درصد انتروکوک جداشد. میانگین سنی و انحراف معیار بیماران مورد مطالعه $۵۵/۲\pm ۲۵/۶$ سال بود. ۸۷ سویه (۶۴/۴ درصد) از مردان و ۴۸ سویه (۳۵/۶ درصد) از زنان جدا گردید. میانگین سنی و انحراف معیار مردان و زنان به ترتیب $۵۳/۰\pm ۲۶/۱$ و $۵۰/۶\pm ۲۴/۵$ سال بود که از لحاظ آماری اختلاف آنها معنی‌دار نبود ($P=0/19$). بیشترین درصد سویه‌های مقاوم به ونکومایسین از بخش مراقبت ویژه پزشکی بود (جدول شماره ۱). و ۵۸ سویه از ۱۳۵ مورد انتروکوک (۴۳ درصد) مقاوم به ونکومایسین بودند.

درمان این عفونت‌ها کاهش می‌یابد و پس از آن درمان چنین عفونت‌هایی به راحتی امکان پذیر نمی‌شود [۱]. مقاومت از طریق جهش ژنتیکی و یا اکتساب مقاومت از سویه‌های مقاوم به دارو ایجاد می‌گردد و به انتروکوک‌ها اجازه می‌دهد تا در محیط‌های مثل بیمارستان و فضاهایی که به طور وسیع از مواد ضد میکروبی استفاده می‌گردد، زنده بمانند. به علاوه، مقاومت به ونکومایسین، از انتروکوک‌ها به سایر باکتری‌های گرم مثبت مثل استافیلیکوک انتقال یافته و ایجاد استافیلیکوک مقاوم به ونکومایسین می‌کند که خود یکی از مشکلات بزرگ درمان عفونت‌های خط‌ناک است [۱۹]. ادامه این روند باعث افزایش تعداد میکروب‌های مقاوم به این داروها شده و به دنبال آن آمار مرگ و میر ناشی از بیماری‌های عفونی مقاوم به داروهای آنتی‌بیوتیک بالا می‌رود؛ این روند اگر کنترل نشود بسیاری از بیماری‌های عفونی قابل کنترل توسط این داروها، به زودی غیر قابل کنترل شده و در سراسر دنیا پخش خواهد شد و چالش بزرگی در درمان به وجود می‌آید [۲۰-۲۲]. از طرف دیگر تجویز بی‌رویه آنتی‌بیوتیک موجب مرگ باکتری‌های مفید دستگاه گوارش مثل گرم منفی‌ها یا بی‌هوایی‌هایی که به عنوان فلور روده زندگی می‌کنند، شده و در نتیجه فلور گوارشی تخریب گردیده و اسهال‌های آنتی‌بیوتیکی را خواهیم داشت [۶]. هدف از این مطالعه بررسی توزیع فراوانی سویه‌های VRE در انتروکوک‌های جدایشده از سواب رکتال بیماران بستری در سه بخش ICU بیمارستان بهشتی کاشان بود.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه مقطعی تعداد ۱۵۶ نمونه سواب رکتال از بیماران بستری در ۳ بخش مراقبت ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان (مراقبت ویژه بخش جراحی، مراقبت ویژه بخش نروسرجری، مراقبت ویژه بخش پزشکی) طی مدت حدود یک-سال جمع‌آوری گردید. پس از کسب اجازه از بیماران سواب‌های گرفته شده از ناحیه رکتال بیماران در ۵ میلی‌لیتر محیط مایع نمک ۶/۵ درصد استریل (Merck) قرار داده شد. طی همانگی با پرستاران سه بخش ICU طی جابه‌جایی بیمار در ساعت مشخص و با رعایت طرح انطباق، نمونه‌گیری انجام پذیرفت. کلیه بیمارانی که به علل مختلف در این سه بخش ICU بستری شده بودند از نظر حضور سویه‌های انتروکوک مقاوم به ونکومایسین VRE مورد ارزیابی قرار گرفتند. سواب‌ها بعد از

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی انتروکوک مقاوم به ونکومایسین در نمونه‌های سواب رکتال جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

بیمارستان شهید بهشتی کاشان بر حسب نوع ICU						
P	جمع	پزشکی	نروسجری	جراحی	نوع ICU	انتروکوک مقاوم به ونکومایسین
0.009	(43)۵۸	(۶۰/۷)۱۷	(۳۶/۴)۱۶	(۳۹/۷)۲۵	دارد	
	(۵۷)۷۷	(۳۹/۳)۱۱	(۶۳/۶)۲۸	(۶۰/۳)۳۸	ندارد	
				(۱۰۰)۲۸	(۱۰۰)۲۴	جمع

آنٹی‌بیوتیک مصرف کرده بودند، ۲/۶ برابر آنهایی که یک تا دو نوع آنتی‌بیوتیک مصرف کرده بودند [CI 95% (۱/۲۶-۵/۵۸)] (P<0.009). بیمارانی که یک یا بیش از یک هفته مشاهده گردید (P<0.009). بیمارانی که یک یا بیش از یک هفته در بیمارستان بستری شدن افراد و وجود VRE ارتباط معنی‌داری در بیمارستان بستری بودند ۵/۷ برابر آنهایی که کمتر از یک هفته بستری بودند حامل انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین بودند [CI 95% (۲/۷-۱۲/۲۸)]. در این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین مصرف کورتون، وجود دیابت و سابقه بستری در بیمارستان و مقاومت به ونکومایسین مشاهده نگردید (جدول شماره ۲).

در این مطالعه از ۵۸ بیماری که حامل انتروکوک مقاوم به ونکومایسین بودند، ۵۵ نفر (۹۴/۸ درصد) سابقه مصرف آنتی‌بیوتیک داشتند و از ۷۷ بیماری که حامل VRE بودند، ۶۴ نفر (۸۳/۱ درصد) آنتی‌بیوتیک مصرف کرده بودند که اختلاف آنها از لحاظ آماری معنی‌دار است (P=0.037). بیمارانی که آنتی‌بیوتیک مصرف نموده ۳/۷ برابر آنهایی که آنتی‌بیوتیک مصرف نکرده بودند حامل انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین بودند [CI 95% (۱/۰۹-۱۳/۷)] (P=0.009). از ۵۴ نفری که سه تا چهار نوع آنتی‌بیوتیک مصرف نموده بودند، ۳۲ نفر (۵۹/۲ درصد) و از ۶۵ نفری که یک تا دو نوع آنتی‌بیوتیک مصرف کرده بودند ۲۳ نفر (۳۵/۴ درصد) حامل انتروکوک مقاوم به ونکومایسین بودند که اختلاف آنها از لحاظ آماری معنی‌دار است (P=0.009). بیمارانی که سه تا چهار نوع

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی حاملین انتروکوک مقاوم به ونکومایسین در نمونه‌های سواب رکتال جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان بر حسب عوامل خطر کولونیزاسیون

حاملین انتروکوک مقاوم به ونکومایسین						
CI 95% Lower	CI 95% Upper	OR	P	نادرد	دارد	فاکتورهای خطر
				تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	
1/۰۹	۱۳/۷	۳/۷	<0.037	(۵۳/۸)۶۴	(۴۶/۲)۵۵	صرف آنتی‌بیوتیک
				(۸۱/۳)۱۳	(۱۸/۸)۳	نادرد
۱/۲۶	۵/۵۸	۲/۶۵	0.009	(۶۴/۶)۴۲	(۳۵/۴)۲۳	تعداد آنتی‌بیوتیک مصرفی
				(۴۰/۷)۲۲	(۵۹/۳)۳۲	≥ ۵
۲/۷	۱۲/۲۸	۵/۷	0.009	(۷۶/۸)۵۳	(۲۳/۲)۱۶	مدت زمان بستری
				(۳۶/۴)۲۴	(۶۳/۶)۴۲	≤ ۷
۰/۲۸	۱/۶	۰/۶۸	0.038	(۶۴/۳)۱۸	(۳۵/۷)۱۰	سابقه بستری در بیمارستان
				(۵۰/۱)۵۹	(۴۴/۹)۴۸	نادرد
۰/۳	۱/۷	۰/۸	0.06	(۶۰)۲۴	(۴۰)۱۶	صرف کورتون
				(۵۵/۸)۵۳	(۴۴/۲)۴۲	نادرد
۰/۶	۲/۹	۱/۳	0.036	(۵۱/۵)۱۷	(۴۸/۵)۱۶	بیماری دیابت
				(۵۸/۸)۶۰	(۴۱/۲)۴۲	نادرد

بیماری‌زا و گسترش آن به سایر باکتری‌ها می‌گردد. مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها هم‌چنین مقاومت دارویی را در باکتری‌های فلور نرمال افزایش داده و این مقاومت به باکتری‌هایی که پتانسیل بیماری‌زا بی دارند انتقال می‌یابد؛ در نتیجه درمان غفونت‌های ناشی

بحث

مقاومت آنتی‌بیوتیکی در میان انتروکوک‌ها در جهان رو به افزایش گذاشته است که علت عدمه آن استفاده روزافزون از آنتی‌بیوتیک‌ها می‌باشد. این امر باعث ایجاد مقاومت در باکتری‌های

ابتلای همزمان به چند بیماری و استفاده از وسائل تهاجمی در بیماران بستری در این بخش می‌باشد. وجود این عوامل در این بیماران همراه با مصرف گستردۀ آنتی‌بیوتیک در آنها احتمال انتقال VRE را از بیماری به بیمار دیگر افزایش می‌دهد [۲۸]. در گذشته انتروکوک‌ها به عنوان باکتری‌های با قدرت بیماری‌زاپایین در نظر گرفته می‌شدند، اما پیدایش و گسترش سریع سوبه‌های مقاوم به ونکومایسین باعث مطالعات بیشتر در مورد این باکتری‌ها گردید. در حال حاضر VRE به عنوان یک عامل مهم عفونت‌های بیمارستانی در بسیاری از کشورها مطرح است و عفونت‌های خطرناکی که درمان دارویی مناسبی ندارند و یا انتخاب آنتی‌بیوتیک مناسب برای بهبود آنان بسیار محدود می‌باشد را ایجاد می‌کند [۲۹، ۲۱]. خطرابلا به عفونت‌های بیمارستانی ناشی از VRE با تأخیر در شروع درمان مناسب، نارسایی درمان و مدت زمان طولانی بستری شدن در بیمارستان همراه می‌باشد که در نهایت منجر به افزایش میزان مرگ و میر در بیماران می‌گردد [۳۰].

نتیجه‌گیری

با توجه به میزان شیوع بالای VRE در بخش‌های مراقبت ویژه و اهمیت بقای انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین در بیمارستان و انتشار آن در جامعه، به کارگیری رهنمودهای کنترل عفونت بیمارستانی، آموزش مداوم پرسنل بخش‌های مراقبت ویژه، کنترل موثر کلونیزاسیون و پیشگیری از عفونت‌های ناشی از VRE در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان ضروری می‌باشد.

تشکر و قدردانی

این مطالعه بخشی از رساله کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی پزشکی و طرح پژوهشی با شماره ۹۰۹۵ می‌باشد که با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اجرا شده است. از پرسنل محترم ICU بیمارستان شهید بهشتی کاشان که در انجام این طرح ما را یاری کردند، تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

از آنها را مشکل و پیچیده می‌نماید [۲۳]. نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از ۴۰ درصد بیماران بستری در ICU حامل انتروکوک مقاوم به ونکومایسین بودند. ونکومایسین آنتی‌بیوتیک گلیکوپیتیدی است که برای درمان عفونت‌های ناشی از انتروکوک که با آنتی‌بیوتیک‌های معمول درمان نمی‌شوند، استفاده می‌شود. شیوع بالای مقاومت به این آنتی‌بیوتیک می‌تواند چالش بزرگی را در درمان عفونت‌های حاصل از این باکتری ایجاد کند. در مطالعه دیگری که در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بر روی مدفعه بیماران بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان در سال ۸۶ انجام پذیرفت، میزان شیوع VRE در بیماران بستری ۳۸ درصد گزارش گردیده است [۲۴]. با توجه به اینکه مطالعه ما در بخش‌های مراقبت ویژه این بیمارستان بوده که با مصرف بالای آنتی‌بیوتیک همراه است با افزایش شیوع VRE تطابق دارد. اهمیت بررسی میزان سوبه‌های مقاوم در ICU بدین جهت است که کلونیزه شدن با VRE در افراد حساس پس از بستری شدن در این بخش افزایش پیدا می‌کند؛ چون انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین در این بخش بیشتر از بخش‌های دیگر بیمارستان کلونیزه می‌شوند [۲۵]. ضمن اینکه عفونت‌های متعاقب انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین بیشتر در افراد کلونیزه شده با این باکتری رخ می‌دهد [۲۶] پس در بیماران بستری در ICU خطر عفونت‌های حاصله از این سوبه‌ها بیشتر است. شیوع انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین در بیماران مورد بررسی ما از سایر مطالعاتی که در تهران انجام شده بود، رقم بسیار بالاتری را نشان داد؛ به طوری که در دو مطالعه طی سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ میزان شیوع در بیمارستان‌های تهران به ترتیب ۷ و ۱۲ درصد گزارش شده است [۲۷]. مصرف آنتی‌بیوتیک می‌تواند منجر به افزایش فوتیپ مقاومت گردد. مطالعه ما ارتباط قابل توجهی را بین مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و افزایش شیوع VRE نشان داد و این سیر صعودی مقاومت با مصرف سه تا چهار نوع آنتی‌بیوتیک ارتباط معنی‌داری را نشان داد. به طور کلی بیمارانی که در بخش ICU بستری می‌شوند بیشتر در معرض عفونت‌ها قرار می‌گیرند و این به علت وجود فاکتورهای زمینه‌ای مانند نقص ایمنی،

References:

- [1] Emori TG, Gaynes RP. An overview of nosocomial infections, including the role of the microbiology laboratory. *Clin Microbiol Rev* 1993; 6(4): 428–42.
- [2] Chiang PC, Wu TL, Su JY, Huang YC, Chiu YP, et al. Unusual Increase of Vancomycin-resistant Enterococcus faecium but not Enterococcus faecalis at a University Hospital in Taiwan. *Chang Gung Med J* 2007; 30(6): 493-503.
- [3] Jones RN, Marshall SA, Pfaller MA, Wilke WW, Hollis RJ, Erwin ME, et al. Nosocomial enterococcal blood stream infections in the SCOPE program: antimicrobial resistance, species occurrence, molecular testing results, and laboratory testing accuracy. *Diagn Microbiol Infect Dis* 1997; 29: 95–102.
- [4] Palladino S, Kay ID, Flexman JP, Boehm I, Costa AM, Lambert EJ, et al. Rapid detection of

- van A & vanB genes directly from clinical specimens & enrichment broths by real-time multiplex PCR assay. *J Clin Microbiol* 2003; 41(6): 2483-6.
- [5] Liassine N, Frei R, Jan I, Auckenthaler R. Characterization of glycopeptid-resistant enterococci from a Swiss hospital. *J Clin Microbiol* 1993; 36(7): 1853-8.
- [6] Murray BE. Vancomycin-resistant enterococcal infections. *N Engl J Med* 2000; 342(10): 710-21.
- [7] Schentag JJ. Antimicrobial management strategies for gram-positive bacterial resistance in the intensive care unit. *Crit Care Med* 2001; 29(4 Suppl): 100-7.
- [8] Uttley AH, Collins CH, Naidoo J, George RC. Vancomycin-resistant enterococci. *Lancet* 1988; 1 (8575-6): 57-8.
- [9] Cetinkaya Y, Falk P, Mayhall CG. Vancomycin-resistant enterococci. *Clin Microbiol* 2000; 13(4): 686-707.
- [10] Fisher DA, Lin R, Chai L, Kumarasinghe G, Singh K. Vancomycin-resistant enterococci in a Singapore teaching hospital prior to 2005. *Singapore Med J* 2005; 46(6): 311-2.
- [11] Raja NS, Karunakaran R, Ngeow YF, Awang R. Community-acquired vancomycin-resistant Enterococcus faecium: a case report from Malaysia. *J Med Microbiol* 2005; 54(9): 901-3.
- [12] Riley PA, Parasakti N, Teh A. Enterococcus faecium with high-level vancomycin resistance isolated from the blood culture of a bone marrow transplant patient in Malaysia. *Med J Malaysia* 1996; 51: 383-5.
- [13] Zubaidah AW, Ariza A, Azmi S. Hospital-acquired vancomycin-resistant enterococci: now appearing in Kuala Lumpur Hospital. *Med J Malaysia* 2006; 61(4): 487-9.
- [14] Dutka-Malen S, Evers S, Courvalin P. Detection of glycopeptide resistance genotypes and identification to the species level of clinically relevant enterococci by PCR. *J Clin Microbiol* 1995; 33(1): 24-7.
- [15] Huyke MM, Sahm DF, Gilmore MM. Multiple-drug resistant enterococci: the nature of the problem and the agenda for the future. *Emerg Infect Dis* 1998; 4(2): 239-49.
- [16] Liassine N, Frei R, Jan I, Auckenthaler R. Characterization of glycopeptid-resistant enterococci from a Swiss hospital. *J Clin Microbiol* 1998; 36(7): 1853-8.
- [17] Moellering JR. The enterococcus: a classic example of the impact of antimicrobial resistance on therapeutic options. *J Antimicrob Chemother* 1991; 28(1): 1-12.
- [18] Kuriyama T, Williams DW, Patel M, Lewis MA, Jenkins LE, Hill DW, et al. Molecular characterization of clinical and environmental isolates of vancomycin-resistant *Enterococcus faecium* and *Enterococcus faecalis* from a teaching hospital in Wales. *J Med Microbiol* 2003; 52(Pt 9): 821-7.
- [19] Chou YY, Lin TY, Lin JC, Wang NC, Peng MY, Chang FY. Vancomycin-resistant enterococcal bacteremia: comparison of clinical features & outcome between *Enterococcus faecium* & *Enterococcus faecalis*. *J Microbiol Immunol Infect* 2008; 41(1): 124-9.
- [20] Woodford N. Glycopeptide-resistant enterococci: a decade of experience. *J Med Microbiol* 1998; 47(10): 849-62.
- [21] Cetinkaya Y, Falk P, Mayhall CG. Vancomycin-resistance Enterococci. *Clin Microbiol Rev* 2000; 13(4): 686-707.
- [22] Noble WC, Virani Z, Cree RG. Co-transfer of vancomycin and other resistance genes from *Enterococcus faecium* NCTC 12201 to *Staphylococcus aureus*. *FEMS Microbiol Lett* 1992; 72(2): 195-8.
- [23] Murray BE. Problems and dilemmas of antimicrobial resistance. *Pharmacotherapy* 1992; 12(6 Pt 2): 86-93.
- [24] Ghaffarpasand I, Moniri R, Kheradi E, Tehrani MD. Antibiotic resistance in fecal enterococci in hospitalized patients. *Indian J Pathol Microbiol* 2010; 53(4): 898-9.
- [25] Zirakzadeh A, Patel R. Vancomycin-Resistant Enterococci: Colonization, Infection, Detection, and Treatment. *Mayo Clin Proc* 2006; 81(4): 529-36.
- [26] Chavers LS, Moser SA, Benjamin WH, Banks SE, Steinhauer JR, Smith AM, et al. Vancomycin-resistant enterococci: 15 years and counting. *J Hosp Infect* 2003; 53(3): 159-71.
- [27] Emaneini M, Aligholi M, Aminshahi M. Characterization of Glycopeptides, Aminoglycosides and Macrolide Resistance among Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Isolated from Hospitals in Tehran. *Pol J Microbiol* 2008; 57(2): 173-8.
- [28] Yoon YK, Kim HJ, Lee WJ, Lee SE, Yang KS, Park DW, et al. Clinical prediction rule for identifying patients with vancomycin-resistant enterococci (VRE) at the time of admission to the intensive care unit in a low VRE prevalence setting. *J Antimicrob Chemother* 2012; 67(12): 2963-9.
- [29] Woodford N. Glycopeptide-resistant enterococci: a decade of experience. *J Med Microbiol* 1998; 47(10): 849-62.
- [30] Derde LPG, Dautzenberg MJ, Bonten MJ. Chlorhexidine body washing to control antimicrobial-resistant bacteria in intensive care units: a systematic review. *Intensive Care Med* 2012; 38(6): 931-9.