

## **Molecular screening of Y chromosome microdeletions in AZFc and AZFd regions of the non-obstructive azoospermic patients referred to Alzahra hospital in Tabriz**

**Akbarzadeh-Khiavi M<sup>1</sup>, Rahmani SA<sup>1</sup>, Akbarzadeh-Khiavi T<sup>2</sup>, Safary A<sup>3,4\*</sup>**

1- Department of Molecular Biology, Faculty of Basic Sciences, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, I. R. Iran.

2- Bureau of Laboratories, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, I. R. Iran.

3- Anatomical Sciences Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran.

4- Student Research Committee, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran.

Received July 9, 2013; Accepted February 8, 2014

### **Abstract:**

**Background:** The Y-chromosome azoospermic factor (AZF) regions consist of genes whose specific roles and functions in spermatogenesis have not been completely clarified. Hence, recognition of the association between AZF microdeletions and male infertility has suggestions for the diagnosis, treatment, and genetic counseling among infertile patients.

**Materials and Methods:** This descriptive-analytical study was performed on 47 infertile men with non-obstructive azoospermic and normal karyotypes referred to infertility center of Alzahra hospital in Tabriz. Molecular AZF screening technique was performed on the genomic DNA from peripheral blood samples. Multiplex PCR and two different sets of sequence-tagged sites (STS) were used to detect the microdeletions in Y-chromosomal AZF regions and the Y specific sequences.

**Results:** Seventeen (36.17%) out of 47 infertile men had deletions in the AZFc and AZFd regions ( $P<0.05$ ). Among the 17 azoospermic subjects harbouring Y chromosome microdeletions, fourteen were detected in AZFc, two in AZFc+d and one in AZFd regions. Therefore, microdeletions in the AZF regions have a significant effect on azospermia occurrence in the infertile men.

**Conclusion:** Y-chromosome microdeletion analysis can be recommended as an important molecular test among infertile males to obtain reliable genetic information before the administration of assisted-reproductive techniques. It will help to decrease the cost and technical difficulty of the procedure.

**Keywords:** Azoospermic factor, Spermatogenesis, Y-chromosome microdeletions, Male infertility

**\* Corresponding Author.**

**Email:** safary-az@kaums.ac.ir

**Tel:** 0098 914 819 0030

**Fax:** 0098 361 555 1112

**Conflict of Interests: No**

*Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences June, 2014; Vol. 18, No 2, Pages 122-127*

**Please cite this article as:** Akbarzadeh-Khiavi M, Rahmani SA, Akbarzadeh-Khiavi T, Safary A. Molecular screening of Y chromosome microdeletions in AZFc and AZFd regions of the non-obstructive azoospermic patients referred to Alzahra hospital in Tabriz. *Feyz* 2014; 18(2): 122-7.

# آنالیز مولکولی ریزحذف‌های کروموزوم Y در ناحیه AZFc و AZFd در بیماران مبتلا به آزوسپرمی غیر انسدادی مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا تبریز

مصطفی اکبرزاده خیاوی<sup>۱</sup>، سید علی رحمانی<sup>۲</sup>، تاج الدین اکبرزاده خیاوی<sup>۳</sup>، اعظم صفری<sup>\*۴</sup>

خلاصه:

**سابقه و هدف:** نواحی حاوی فاکتورهای آزوسپرمی (AZF) واقع در بازوی بلند کروموزوم Y دارای ژنهای است که نقش و عملکرد خاص آنها در اسپرماتوژن به طور کامل مشخص نشده است. از این رو، شناخت ارتباط بین ریز حذف‌های نواحی AZF با ناباروری در مردان، تشخیص، درمان و مشاوره ژنتیک را مقدور می‌سازد.

**مواد و روش‌ها:** مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر بر روی ۴۷ مرد نابارور مبتلا به آزوسپرمی با دلایل غیر انسدادی مراجعه کننده به بخش ناباروری بیمارستان الزهرا تبریز و کاربیوتایپ نرمال انجام گردید. غربال گری مولکولی ناحیه AZF بر روی DNA ژنومی خون محیطی انجام گردید. تکنیک Multiplex PCR و دو مجموعه از پرایمرهای STS برای تشخیص ریز حذف‌های نواحی AZF و توالی‌های ویژه بر روی کروموزوم Y استفاده گردید.

**نتایج:** از بین ۴۷ مرد نابارور، ۱۷ بیمار (درصد ۳۶/۱۷) دارای ریزحذف‌های کروموزوم Y در نواحی AZFc و AZFd بودند ( $P < 0.05$ ). از این ۱۷ نفر ۱۴ بیمار در ناحیه AZFc و دو بیمار تواما در دو ناحیه AZFc+d و یک بیمار در ناحیه AZFd دارای ریزحذف بودند. نتایج نشان داد ریزحذف‌های نواحی AZF تاثیر معنی داری بر بروز آزوسپرمی در مردان نابارور دارد.

**نتیجه‌گیری:** تجزیه و تحلیل ریزحذف‌های کروموزوم Y به عنوان یک آزمایش مولکولی با اهمیت برای کسب اطلاعات ژنتیکی قابل اعتماد در مردان مبتلا به ناباروری، قبل از استفاده از تکنیک‌های کمک باروری توصیه می‌شود؛ این امر به کاهش هزینه‌ها و مشکلات این تکنیک کمک خواهد نمود.

**واژگان کلیدی:** فاکتور آزوسپرمی (AZF)، اسپرماتوژن، ریزحذف‌های کروموزوم Y، ناباروری مردان

دو ماهنامه علمی-پژوهشی فیض، دوره هجدهم، شماره ۲، خرداد و تیر ۱۳۹۳، صفحات ۱۲۷-۱۲۲

مکانیسم مولکولی نقص اسپرم‌سازی در مردان و ارتباط آن با ریز-حذف‌های بازوی بلند کروموزوم Y (Yq) هنوز به طور کامل شناخته نشده است. با این وجود، به نظر می‌رسد که حذف‌های کروموزوم Y در ناحیه Yq11 در ناباروری مردان موثر است [۳، ۲]. این ناحیه تحت عنوان فاکتور آزوسپرمی (AZF) نامیده می‌شود. فاکتورهای کترول اسپرماتوژن در نواحی AZFb, AZFa و AZFc بر روی بازوی بلند کروموزوم Y قرار دارند [۴]. ژنهای موجود در ناحیه AZF پروتئین‌های اتصال شونده به RNA را کد می‌کنند که در تنظیم بیان ژن، متabolism RNA بسته‌بندی، نقل و انتقالات سیتوپلاسم و پیرایش RNA دخالت دارند [۵]. حذف‌های نواحی AZF به احتمال زیاد ناشی از نو-ترکیبی بین توالی‌های تکراری درون کروموزومی می‌باشد. ریز-حذف‌های کروموزوم Y بعد از سندروم کلاین فیلتر، شایع ترین علت ژنتیکی ناباروری بشمار می‌آیدن [۶]. حذف ناحیه AZFa با فعدان کامل سلول‌های زایشی، حذف ناحیه AZFb با توقف رشد سلول‌های زایشی در پروفاز میوز I و حذف ناحیه AZFc با کاهش اسپرم‌سازی یا توقف بلوغ اسپرم، همراه می‌گردد [۷]. ناحیه AZFd به صورت هم‌پوشان با ناحیه AZFc و AZFb قرار دارد

مقدمه

مطالعات نشان داده‌اند حدود ۱۰-۱۵ درصد زوج‌ها مشکل ناباروری دارند که علل ۵۰ درصد از آنها اختلال در اسپرماتوژن می‌باشد. ژنهایی که در جریان اسپرماتوژن بیان می‌گردند، مسئول کد کردن پروتئین‌های لازم جهت مراحل اختصاصی تولید اسپرم هستند [۱]. کروموزوم Y یکی از کوچک‌ترین کروموزوم‌ها در ژنوم انسان است که با ۶۰ میلیون توالی بازی در خود نزدیک به ۲ درصد کل ژنوم انسانی را تشکیل می‌دهد. نقش اصلی کروموزوم Y در تکثیر گونه‌ها، تعیین جنسیت و کترول اسپرماتوژن می‌باشد.

<sup>۱</sup> کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی ملکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

<sup>۲</sup> استادیار، گروه زیست شناسی ملکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

<sup>۳</sup> کارشناس ارشد، اداره امور آزمایشگاه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

<sup>۴</sup> دانشجوی دکترا، مرکز تحقیقات علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

<sup>۵</sup> دانشجوی دکترا، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

<sup>\*</sup> نشان نهاده مسئول

کاشان، کیلومتر ۵ بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات علوم تشریح

تلفن: ۰۹۱۴ ۸۱۹۰۰۳، دوره‌لوبیس: ۳۶۱ ۵۵۵۱۱۱۲

پست الکترونیک: safary-az@kaums.ac.ir

تاریخ پذیرش نهاد: ۹۲/۱۱/۱۹، تاریخ دریافت: ۹۲/۴/۱۸

انتخاب STS پرایمرها: برای بررسی افراد بیمار و کنترل، مارکر STS برای دو ناحیه AZFd، AZFc و یک مارکر ۶ برای ناحیه SRY طبق راهنمای استاندارد EAA/EMON از سایت اختصاصی پرایمر STS ها (STS MSY Breakpoint) طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. این (Mapper database) عبارت بودند از: SY157 و SY255 برای STS ها، SY153 و SY152 برای ناحیه AZFc و SY145، SY145 و SY152 برای ناحیه AZFd که در جدول شماره ۱ آمده است. برای شناسایی ریز- حذف‌های کروموزوم Y در نواحی AZF توسط واکنش زنجیره‌ای PCR دو گروه به صورت زیر طراحی گردید: پلیمراز Multiplex I : SY153, SY157, SY254 (AZFd,c,c). II : SY255, SY 145, SY152 ,SRY (AZFc,d,d,positive control) واکنش زنجیره‌ای، بلمراز Multiplex: حجم واکنش

واکنش زنجیره‌ای پلیمرات Multiplex حجم واکنش

برای Multiplex PCR ۲۵ μl در نظر گرفته شد که هر واکنش حاوی DNA پلیمراز Smartaq (سینا ژن، ایران): ۱۰ μl، ۰/۲۵ μl، هر PCR پرایمر: ۰/۰۵ μl، dNTP (۱۰ میلی مولار): ۰/۰۵ μl، بافر (۱۰X) MgCl<sub>2</sub>: ۰/۷۵ μl، DNA فرد: ۰/۵ μl، بیمار، کنترل‌های مثبت و یا منفی: ۰/۲ μl و ۰/۱ μl بود. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز توسط دستگاه ترموسایکل Peqlab ساخت شرکت Peqlab کشور آلمان انجام شد. واکنش PCR در سیکل شامل دناتوراسیون اولیه به مدت ۳ دقیقه در دمای ۹۴ °C، دناتوراسیون، اتصال پرایمر و طویل سازی به ترتیب ۵ به مدت ۳۰ ثانیه، ۵۷/۸ °C به مدت ۳۰ ثانیه و ۷۲ °C به مدت ۴۵ ثانیه و طویل سازی نهایی به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۷۲ °C انجام شد. مقدار ۱۱۱ μl از محصول واکنش روی ژل آکارز ۲ درصد حاوی ۰/۰۵ μg/ml آتیدیوم بروماید، الکتروفوروز و مورد مشاهده و تشخیص قرار گرفت.

آنالیز آماری: تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش ۱۱/۲ انجام شد. برای استبانتاب داده‌ها آزمون‌های مجدوز کای و پیرسون مورد استفاده قرار گرفت و مقادیر  $P$  کمتر از  $0.05$  از نظر آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد.

نتائج

از ۶۰ مرد نایاب رور مورد مطالعه، ۴۷ بیمار که مبتلا به آزواسپرمی غیر انسدادی بودند انتخاب شده و مورد مطالعه مولکولی قرار گرفتند. همه مردان نایاب رور انتخابی کاریوتایپ نرمال داشتند. در ۱۷ نفر از ۴۷ بیمار (۳۶٪ درصد) Riz-XY حذف در دو ناحیه AZFc و AZFd مشاهده شد (جدول شماره ۲). از ۱۷ بیمار، ۲ مرد آزواسپرم دارای ترکیبی از ریزنحذف‌ها در


و حذف این ناحیه الیگو اسپرمی و یا اختلالات مورفوЛОژیک اسپرم را باعث می شود [۵]. بنابراین، ریز حذف های نواحی AZF با الیگو اسپرمی خفیف، شدید و یا آزو اسپرمی همراه خواهد بود [۶]. بررسی ریز حذف های نواحی AZF به علت توارث آنها به ویژه در موارد استفاده از روش های کمک باروری دارای اهمیت فوق العاده- ای می باشد [۶]. از آنجایی که برای یک فنوتیپ خاص امکان وجود ژنوتیپ های متفاوت بر اساس جوامع مختلف وجود دارد، تشخیص ریز حذف های کروموزوم Y در یک مرد نابارور، تشخیص مناسب بیماری محسوب می شود. هدف از این تحقیق بررسی فراوانی ریز- حذف های کروموزوم Y با استفاده از تکنیک مولکولی Multiplex PCR در بیماران مبتلا به آزو اسپرمی غیر انسدادی مراجعه کننده به مرکز اورولوژی و درمان ناباروری بیمارستان الزهرا تبریز می باشد.

مواد و روش‌ها

انتخاب بیمار و آنالیز سیتوژنتیکی: در این مطالعه بررسی اولیه بر روی ۶۰ مرد نایارور مراجعه کننده به بخش نایاروری بیمارستان الزهراء تبریز انجام شد. بیمارانی که دچار آزواسپرمی ناشی از انسداد مجرای (واریکوسل)، بیماری کرپتور-کیدیسم (عدم نزول بیضه) و یا اداری سابقه عمل جراحی بر روی مجرای ادراری بودند، از مطالعه خارج شده و از میان ۶۰ مرد نایارور، ۴۷ بیمار مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی مورد مطالعه قرار گرفتند. این بیماران سطح هورمون‌های LH و FSH با الاتر از نرمال و تستوسترون کمتر از نرمال داشتند (محدوه نرمال برای بررسی و تستوسترون کمتر از نرمال ۱۰ mIV/ml و برای LH کمتر از ۱۰ mIV/ml و تستوسترون ۲۷۰ ng/dl تا ۱۰۷۰ ng/dl در نظر گرفته شد). جهت رعایت اصول اخلاقی پس از ارائه توضیحات لازم به بیمار رضایت نامه از فرد دریافت و پرسشنامه پر گردید. کلیه افراد جهت روشن شدن علت اولیه نایاروری طبق روش‌های استاندارد مورد بررسی کاریوتپ قرار گرفتند. چهل مرد بارور دارای فرزند با فرمول کروموزومی ۴۶، XY جهت بررسی و اطمینان از عدم بروز جهش در افراد سالم بارور به عنوان کنترل‌های مثبت و یک زن بارور نرمال به عنوان کنترل منفی جهت اطمینان از عدم حضور فاکتورهای AZF در کروموزوم جنسی انتخاب شدند. استخراج DNA: از افراد مورد مطالعه ۵ میلی لیتر خون گرفته شده و در لوله‌های حاوی EDTA ریخته شد. برای استخراج DNA از کیت استخراج QIAamp DNA Mini Kit (کیاژن، آلمان) استفاده گردید. DNA با غلظت  $5 \mu\text{g}$  ۳-۱۲ درون لوله‌های مخصوص ریخته شده و در دمای  $-20^\circ\text{C}$  درجه سانتی گراد

ریزحذف در نواحی AZF (۳۶/۱۷) دارد. هیچ ریزحذفی در نمونه‌های کنترل مشاهده نگردید. الگوی فراوانی نواحی دارای ریزحذف بر اساس پرایمرهای مورد استفاده (جدول شماره ۳) و نتایج مربوط به Multiplex PCR و ژل الکتروفورز در تصویر شماره ۱ نشان داده شده است.

دو ناحیه AZF (AZFc+d) بودند. در این مطالعه، نفر از ۱۷ بیمار (۸۲/۳۵ درصد) دارای ریزحذف در ناحیه AZFc بر روی کروموزوم Y بوده و بیشترین ریزحذف این ناحیه در پرایمر SY157 (Locus: DYS240) مشاهده شد. بررسی‌های آماری نشان داد بروز ریزحذف‌های کروموزوم Y تاثیر معنی‌داری (P<0.05) در ابتلا به آزوسپرمی در مقایسه با مردان نابارور فقد



تصویر شماره ۱- نتایج آنالیز Multiplex PCR. بیماران ستون‌های ۱۷، ۲۰-۲۳، ۲۵-۲۷، ۲۹ و ۳۰ در هیچ‌یک از پرایمرهای گروه I ریزحذف نداشتند. بیماران ستون‌های ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۴ و ۲۸ در پرایمر SY157 دارای ریزحذف بودند (به ترتیب بیماران کدهای ۱۶، ۰۳۶، ۰۲۴، ۰۴۱ و ۰۱۸).

جدول شماره ۱- توالی پرایمرهای STS و مناطق مربوط به آنها

STS	Locus	Region	Genbank accession	Size (bp)	Sequence 5'—3'
SY254	DAZ	AZFc	G38349	380	GGGTGTTACCAGAAGGC AAACCGTATCTACCAAGCAGC
SY255	DAZ	AZFc	G65827	126	GTTACAGGATTCCGGCGTGAT CTCGTCATGTGCAGCCAC
SY157	DYS240	AZFc	G12005	290	CTTAGGAAAAAGTGAAGCCG CCTGCTGTCAGCAAGATACA
SY153	DYS237	AZFd	G12004	139	GCATCCTCATTTATGTCCA CAACCCAAAAGCACTGAGTA
SY152	DYS236	AZFd	G75623	120	AAGACAGTCTGCCATGTTCA ACAGGAGGGTACTTAGCAGT
SY145	DYF51S1	AZFd	G66358	143	CAACACAAAAACACTCATATACTCG TTGAGAATAATTGTATGTTACGGG
SY14	SRY	Yp	G38356	491	GAATATTCCCGCTCTCCGG GCTGGTGCCTCCATTCTTGAG

جدول شماره ۲- انواع ریزحذف‌های کروموزوم Y در نواحی AZF

Phenotype	Karyotype	AZFc deletion, % (n)	AZFd deletion, % (n)	Combined deletion, % (n)	Total number of deletion, % (n)
Azoospermic	Normal, 46,XY	۲۹/۷۸ (۱۴/۴۷)	۲/۱۲ (۱/۴۷)	۴/۲۵ (۲/۴۷)	۳۷/۱۷ (۱۷/۴۷)

جدول شماره ۳- الگوی فراوانی نواحی دارای ریزحذف‌ها بر اساس پرایمرهای STS مورد مطالعه

Patients	AZFc		AZFd			
	SY255	SY254	SY157	SY153	SY152	SY145
۷۷/۴۷	-					
۱۱/۷۶	-	-				-
۵/۸۸				-	-	
۵/۸۸	-	-				

کروموزوم Y باعث افزایش میزان نقص در روند اسپرماتوژنر می‌شود [۱۰]؛ به طوری که فراوانی این ریزحذف‌ها، بین ۱ تا ۵۵ درصد گزارش شده است [۱۱، ۱۲]. تفاوت‌های قومی و منطقه‌ای از عوامل

بحث  
ریزحذف‌های کروموزوم Y دومین علت اصلی ناباروری در مردان، بعد از سندروم کلین فلتر می‌باشد [۹]. حذف‌های

این، تعداد بیماران مورد بررسی و نحوه انتخاب بیماران بر حسب شدت اختلال در تعداد اسپرم، اتیولوژی اختلال اسپرماتوزن، تفاوت‌های اقلیمی و ناحیه‌ای نیز می‌تواند در تفاوت فراوانی‌ها موثر باشد [۲۴]. بر اساس نتایج مطالعات اخیر، بسیاری از موارد آزواسپرمی‌های غیر انسدادی، منشاً ژنتیکی دارند. بنابراین، توصیه می‌شود که همه مردان دارای حذف‌های ناحیه AZFc، با توجه به تاثیر منفی پیش‌روندۀ ریزحذف‌های کروموزوم Y در تولید، کاهش و حتی فقدان کامل اسپرم، در زمان بلوغ تحت آزمایشات آندرولوژیکی قرار بگیرند و در صورت مشاهده اسپرم، در ابتدای دوران جوانی قبل از آسیب‌های ناشی از بالا رفتن سن، اسپرم آن‌ها ذخیره گردد [۲۶]. هدف این مطالعه بررسی ریزحذف‌های کروموزوم Y در مردان مبتلا به ناباروری آزواسپرمی غیرانسدادی در شمال غرب ایران و در منطقه آذربایجان و شناسایی مارکرهای STS های مناسب مرتبط با آزواسپرمی بوده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، آنالیز مولکولی ریزحذف‌های کروموزوم Y برای کسب اطلاعات دقیق جهت مشاوره ژنتیکی، قبل از استفاده از تکنیک‌های کمک باروری با توجه به شانس انتقال آنها به نسل بعدی باستی صورت پذیرد.

### نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج آماری بدست آمده بین بروز ریزحذف‌های ناحیه AZFc,d کروموزوم Y در مردان مبتلا به آزواسپرمی در مقایسه با مردان آزواسپرم فاقد ریزحذف در این نواحی به خصوص پرایمر SY157 اختلاف معنی‌داری وجود دارد. با توجه به سهم این پرایمر در شناسایی ریزحذف‌های کروموزوم Y [۱۳] نفر از ۱۷ بیمار آزواسپرم، ۴/۴۷ درصد)، به نظر می‌رسد این STS برای شناسایی ریزحذف‌های کروموزوم Y اختصاصی‌تری دارد. با این وجود، برای اطمینان بیشتر از کارایی بالای این پرایمر بهتر است در مناطق مختلف و نزدیکی‌های متوات و جمعیت‌های بزرگ‌تر از مردان مبتلا به ناباروری غیر انسدادی مورد استفاده قرار گیرد.

### تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از همکاری مرکز ناباروری بیمارستان الزهرا تبریز، مرکز تحقیقات علوم تشریع دانشگاه علوم پزشکی کاشان و همچنین راهنمایی جناب آقای دکتر اعظمی و زحمات جناب آقای دکتر مطلبی آذر در راستای انجام این پروژه صمیمانه تشکر و قدردانی می‌گردد.

موثر در تنوع و میزان شیوع ریز حذف‌های کروموزوم Y به شمار می‌روند [۱۳]. علاوه بر این، ناهمگونی فنوتیپی در حذف‌های نواحی AZF می‌تواند ناشی از تاثیرات محیطی، بیان ژنی متوات در اثر تغییرات ژنی، نفوذ متغیر و حضور همولوگ‌های اتوزومال مانند DAZ like autosomal on 3p25 (DAZLA) باشد [۱۴]. در دهه گذشته مطالعات فراوانی در رابطه با ریزحذف‌های کروموزوم Y انجام شده است: نتایج حاصل از این مطالعات نشان داده است که بیشترین ریزحذف‌های کروموزوم Y در دو ناحیه AZFc و AZFb به ترتیب با فراوانی ۶۰ و ۱۶ درصد در مردان مبتلا به ناباروری اتفاق افتاده است [۱۳]. در مطالعه حاضر میزان ریزحذف‌های کروموزوم Y بالغ بر ۳۶/۱۷ درصد بود که این میزان بیشتر از فراوانی (۱۶ درصد) گزارش شده توسط آکادمی آندرولوژی اروپا (EAA) می‌باشد [۱۵]. از ۴۷ مرد نابارور مبتلا به آزواسپرمی، ۱۴ نفر (۲۹/۷۸ درصد) دارای ریزحذف در ناحیه AZFc، یک بیمار (۲/۱۲ درصد) دارای ریزحذف در ناحیه AZFd و دو نفر (۴/۲۵ درصد) دارای ریزحذف ترکیب در دو ناحیه AZFc+d بودند. بیشترین میزان ریزحذف‌های کروموزوم Y مردان مبتلا به آزواسپرمی غیرانسدادی مربوط به ناحیه AZFc با فراوانی ۲۹/۷۸ درصد و در پرایمرهای SY157 و SY254 بود که از این میزان در ۳ بیمار حذف ژن DAZ (SY254) مشاهده گردید. این در حالی است که هیچ حذفی در پرایمر SY255 مشاهده نگردید. این یافته‌ها با نتایج مطالعات پیشین که میزان ریزحذف‌های ناحیه AZFc را بیشتر از ریزحذف‌های سایر نواحی AZF بیان کرده بودند، مطابقت دارد [۱۶-۲۰]. این در حالی است که بعضی مطالعات میزان ریزحذف‌های ناحیه AZFc را ۵ درصد از ۴۰ مرد نابارور و میزان کل ریزحذف‌های نواحی AZF را بسیار پایین گزارش کرده‌اند که با نتایج مطالعه حاضر هم خوانی ندارند [۲۱-۲۳]. هم‌چنین در مطالعه انجام شده توسط میرفخرایی و همکاران بر روی مردان نابارور مبتلا به آزواسپرمی، بیشترین میزان ریزحذف‌های کروموزوم Y در ناحیه AZFb با فراوانی ۶۶/۱۷ درصد گزارش شده است که با نتایج این مطالعه مغایرت دارد [۴]. این در حالی است که در بعضی مطالعات هیچ ریزحذفی در نواحی AZF بر روی کروموزوم Y مردان نابارور گزارش نشده است [۲۵,۲۶]. این تفاوت در فراوانی حذف‌ها و نقاط حذف شده در مطالعات مختلف ممکن است به دلیل تفاوت‌های ژنتیکی جمعیت‌های مختلف، به ویژه هاپلوتیپ‌های مخصوص کروموزوم Y، سابقه ژنتیکی یا اثرات محیطی و هم‌چنین پرایمرهای مختلف به کار گرفته باشند. علاوه بر

**References:**

- [1] Park SH, Lee HS, Choe JH, Lee JS, Seo JT. Success rate of microsurgical multiple testicular sperm extraction and sperm presence in the ejaculate in 127orean men with y chromosome microdeletions. *Korean J Urol* 2013; 54(8): 536-40.
- [2] Moore FL, Reijo-Pera RA. Male sperm motility dictated by mother's mtDNA. *Am J Hum Genet* 2000; 67(3): 543-48.
- [3] Choi DK, Gong IH, Hwang JH, Oh JJ, Hong JY. Detection of Y Chromosome Microdeletion is Valuable in the Treatment of Patients with Nonobstructive Azoospermia and Oligoasthenoteratozoospermia: Sperm Retrieval Rate and Birth Rate. *Korean J Urol* 2013; 54(2): 111-6.
- [4] Mirfakhraie R, Mirzajani F, Kalantar SM, Montazeri M, Salsabili N, Pourmand GR, et al. High prevalence of AZFb microdeletion in Iranian patients with idiopathic non-obstructive azoospermia. *Indian J Med Res* 2010; 132: 265-70.
- [5] Sadeghi-Nejad H, Farrokhi F. Genetics of Azoospermia: Current Knowledge, Clinical Implications, and Future Directions. Part II Y Chromosome Microdeletions. *Urol J* 2007; 4(4): 192-206.
- [6] Ferlin A, Moro E, Onisto M, Toscano E, Bettella A, Foresta C. Absence of testicular DAZ gene expression in idiopathic sever testiculopathies. *Hum Repord* 1999; 14(9): 2286-92.
- [7] Kim MJ, Choi HW, Park SY, Song IO, Seo JT, Lee HS. Molecular and cytogenetic studies of 101 infertile men with microdeletions of Y chromosome in 1,306 infertile Korean men. *J Assist Reprod Genet* 2012; 29(6): 539-46.
- [8] Ghorbian S. Routine diagnostic testing of Y chromosome deletions in male infertile and subfertile. *Gene* 2012; 503(1): 160-4.
- [9] Simoni M, Bakker E, Krausz C. EAA/EMQN best practice guidelines for molecular diagnosis of y-chromosomal microdeletions. State of the art 2004. *Int J Androl* 2004; 27(4): 240-9.
- [10] Krausz C, Rajpert-De Meyts E, Frydelund-Larsen L, Quintana-Murci L, McElreavey K, Skakkebaek NE. Double blind Y chromosome microdeletion analysis in men with known sperm parameters and reproductive hormone profiles: microdeletions are specific for spermatogenic failure. *J Clin Endocrinol Metab* 2001; 86(6): 2638-42.
- [11] Osterlund C, Segersteen E, Arver S, Pousette A. Low number of Y-chromosome deletions in infertile azoospermic men at a Swedish andrology centre. *Int J Androl* 2000; 23(4): 225-9.
- [12] Chiang HS, Yeh SD, Wu CC, Huang BC, Tsai HJ, Fang CL. Clinical and pathological correlation of the microdeletion of Y chromosome for the 30 patients with azoospermia and severe oligoasthenospermia. *Asian J Androl* 2004; 6(4): 369-75.
- [13] Krausz C, Forti G, McElreavey K. The Y chromosome and male fertility and infertility. *Int J Androl* 2003; 26(2): 70-5.
- [14] Dada R, Gupta NP, Kucherla K. AZF microdeletions associated with idiopathic and non-idiopathic cases with cryptorchidism and varicocele. *Asian J Androl* 2002; 4(4): 259-63.
- [15] Hadj-Kacem L, Hadj-Kacem H, Ayadi H, Ammar-Keskes L, Chakroun-Fki N, Rebai T, et al. Screening of Y chromosome microdeletions in Tunisian infertile men. *Arch Androl* 2006; 52(3): 1-7.
- [16] Foresta C, Ferlin A, Moro E. Deletion and expression analysis of AZFa genes on the human Y chromosome revealed a major role for DBY in male infertility. *Hum Mol Genet* 2000; 9(8): 1161-69.
- [17] Fu L, Xiong DK, Ding XP, Li C, Zhang LY, Ding M, et al. Genetic screening for chromosomal abnormalities and Y chromosome microdeletions in Chinese infertile men. *J Assist Reprod Genet* 2012; 29(6): 521-7.
- [18] Lin YM, Chen CW, Sun HS, Hsu CC, Chen JM, Lin SJ, et al. Y-chromosome microdeletion and its effect on reproductive decisions in 127aiwanese patients presenting with nonobstructive azoospermia. *Urology* 2000; 56(6): 1041-6.
- [19] Totonchi M, Mohseni Meybodi A, Borjian Boroujeni P, Sedighi Gilani M, Almadani N, Gourabi H. Clinical data for 185 infertile Iranian men with Y-chromosome microdeletion. *J Assist Reprod Genet* 2012; 29(8): 847-53.
- [20] Omrani MD, Samadzadeh S, Bagheri M, Attar K. Y chromosome microdeletions in idiopathic infertile men from west azarbajian. *Urol J* 2006; 3(1): 38-43.
- [21] Akbari Asbagh F, Sina A, Najmabadi H, Akbari MT, Tabarroki A, Pourmand Gh. Prevalence of Y chromosome microdeletions in Iranian infertile men. *Acta Med Iran* 2003; 41(3): 164-70.
- [22] Bor P, Hindkjær J, Kølvraa S, Ingerslev HJ. Y chromosome microdeletions and cytogenetic findings in unselected ICSI candidates at a Danish fertility clinic. *J Assist Reprod Genet* 2002; 19(5): 224-31.
- [23] Sargin CF, Berker-Karaüzüm S, Manguoğlu E, Erdoğu T, Karaveli S, Gülkesen KH, et al. AZF microdeletions on the Y chromosome of infertile men from Turkey. *Ann Genet* 2004; 47(1): 61-8.
- [24] Balkan M, Tekes S, Gedik A. Cytogenetic and Y chromosome microdeletion screening studies in infertile males with Oligozoospermia and Azoo-spermia in Southeast Turkey. *J Assist Reprod Genet* 2008; 25(11-12): 559-65.
- [25] Güney AI, Javadova D, Kirac D, Ulucan K, Koc G, Ergec D, et al. Detection of Y chromosome microdeletions and mitochondrial DNA mutations in male infertility patients. *Genet Mol Res* 2012; 11(2): 1039-48.
- [26] Faddy MJ, Silber SJ, Gosden RG. Intra-cytoplasmic sperm injection and infertility. *Nat Genet* 2001; 29(2): 131.