

## Effect of zinc oxide nanoparticles synthesized by aqueous extract of *hyssopus officinalis* on colon cancer cell line (HT-29) and normal cell line (Huvec), and also on proxytonin protein (PCT) in *In vivo* environment

Rahimi-Kalateh-Shah-Mohammad Gh<sup>1</sup>, Homayouni-Tabrizi M<sup>1\*</sup>, Ardalan T<sup>2</sup>, Hormozi B<sup>1</sup>

1- Department of Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, I. R. Iran.

2- Department of Chemistry, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, I. R. Iran.

Received: 2019/02/1 | Accepted: 2019/08/19

### Abstract:

**Background:** Today, with the increasing rates of cancer, especially colon cancer, and due to the side effects of chemical drugs in the treatment of these diseases, more attention to safe drugs with less side effects is needed. This study aimed to evaluate the toxicity of nanoparticles of zinc oxide synthesized by green hyssop plant extracts method, on colon cancer cell line (HT29) and examined the effects of nanoparticles on calcitonin proxy blood protein

**Materials and Methods:** In this in vitro study, the MTT method was used to evaluate the toxicity of this nanoparticle at four concentrations (250, 125, 62.5, 31.2 µg/ml) against normal cells and colon cancer cells. In the in vivo environment, 20 adult male mice were randomly assigned into 3 experimental groups (n=5), 100, 200, 300 mg/kg of 20 nm oxide nanoparticles, orally, and the control group (without receiving nanoparticles). Finally, the mice were anesthetized by an ether and an autopsy and blood samples from the heart was taken to carry out the proxitonin protein test by a solvent cannula in the clinical laboratory.

**Results:** These nanoparticles are capable of inhibiting cancer cells at low concentrations (62.5, 31.2 µg/ml) and IC<sub>50</sub> is reported to be about 62.5 µg/ml ( $P<0.0001$ ). The results of the PCT test as a result of treatment of mice showed a slight increase in proxitonin protein at a concentration of 300 mg/kg ( $P<0.0001$ ).

**Conclusion:** By increasing the concentration of zinc oxide nanoparticles synthesized by the green method from the aqueous extract of the hyssop plant, its toxicity increases and causes a rise in the proxitonin protein in the blood.

**Keywords:** Zinc oxide nanoparticles, *hyssopus* aqueous extract, HT-2 cell line and peripheral environment, Proxytonine protein

**\*Corresponding Author:**

Email: mhomayouni6@gmail.com

Tel: 0098 915 450 5894

Fax: 0098 513 843 5000

Conflict of Interests: No

*Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences, February, 2020; Vol. 23, No 6, Pages 588-595*

**Please cite this article as:** Rahimi-Kalateh-Shah-Mohammad Gh, Homayouni-Tabrizi M, Ardalan T, Hormozi B. Effect of zinc oxide nanoparticles synthesized by aqueous extract of *hyssopus officinalis* on colon cancer cell line (HT-29) and normal cell line (Huvec), and also on proxitonin protein (PCT) in *In vivo* environment. *Feyz* 2020; 23(6): 588-95.

# بررسی اثر نانوذرات اکسید روی سنتزشده توسط عصاره‌ی آبی گیاه زوفا (*Hyssopus officinalis*) بر رده‌ی سلولی سرطان کولون (HT-29) و ارزیابی اثرات این نانوذرات بر پروتئین پروکسی‌تونین (PCT) در محیط *invivo*

قاسم رحیمی<sup>۱</sup> کلاته شاه محمد<sup>۲</sup>، مسعود همایونی تبریزی<sup>\*</sup>، توران اردلان<sup>۲</sup>، بهاره هرمزی<sup>۱</sup>

خلاصه:

**سابقه و هدف:** امروزه با افزایش سرطان، بهویژه سرطان کولون و همچنین با در نظر گرفتن عوارض داروهای شیمیایی در درمان این گونه بیماری‌ها بایستی به روش‌های بدون عوارض توجه بیشتری نمود. بر همین اساس در این تحقیق، به ارزیابی سمیت نانوذرات اکسید روی سنتزشده به روش سیز از عصاره‌ی گیاه زوفا بر رده‌ی سلولی سرطان کولون (HT29) پرداختیم و اثرات این نانوذرات بر پروتئین پروکسی‌تونین خون نیز مورد بررسی قرار گرفت.

**مواد و روش‌ها:** در این مطالعه تحقیقاتی و پژوهشی در محیط *invitro* از روش MTT با هدف ارزیابی میزان سمیت این نانوذره علیه سلول‌های نرمال و سلول‌های سرطان کولون استفاده شد، همچنین در محیط *invivo* تعداد ۲۰ سرموش سوری بالغ نر در ۳ گروه تجربی (n=5) مقدار ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم نانوذرات اکسید روی دریافت کردند و ۱ گروه کنترل (بدون دریافت نانوذرات) در نظر گرفته شد؛ درنهایت موش‌ها توسط کتابخانه و زایلزاپین بی‌هوش و کالبدشکافی شدند و خون‌گیری از قلب جهت انجام تست پروتئین پروکسی‌تونین توسط سل کانتر انجام شد.

**نتایج:** این نانوذرات قادر به مهار سلول‌های سرطانی در غلظت‌های پایین (۶۲/۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر) بودند و IC<sub>50</sub> آن حدوداً ۶۲/۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر (P<0/۰۰۱) گزارش شد. نتایج حاصل از تست PCT در نتیجه‌ی تیمار موش‌ها، افزایش خفیف از پروتئین پروکسی‌تونین در غلظت ۳۰۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم (P<0/۰۰۱) را نشان داد.

**نتیجه‌گیری:** با افزایش غلظت نانوذرات اکسید روی سنتزشده به روش سیز از عصاره‌ی گیاه زوفا خاصیت سمیت آن نیز افزایش می‌یابد و در خون، باعث افزایش پروتئین پروکسی‌تونین می‌شود.

**واژگان کلیدی:** نانوذرات اکسید روی، عصاره‌ی آبی گیاه زوفا، رده‌ی سلولی-2 HT و محیط برون‌تنی، پروتئین پروکسی‌تونین  
دو ماهنامه علمی - پژوهشی فیض، دوره بیست و سوم، شماره ۶، بهمن و اسفند ۹۸، صفحات ۵۹۵-۵۸۸

## مقدمه

در درمان و کنترل بیماری‌های نظری سرطان از جمله سرطان کولون و همچنین بیماری‌های مرتبط با تیروئید، داروها و ترکیبات شیمیایی متعددی به کار گرفته شده، اما هنوز بهبود کلی بیماری گزارش نشده است و همچنین با در نظر گرفتن توجه بی‌شماری از محققان به نانوذرات اکسید روی، بهدلیل دارا بودن خواص فیزیکی و شیمیایی خاصی که دارند، در این پژوهش به اثر ضدسرطانی و التهاب‌زاپی نانوذرات اکسید روی پرداخته شد. در حال حاضر به طور خاص برای درمان سرطان بسیاری از مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱].

علوم دارویی از نانوذرات سنتزشده به روش سیز برای کاهش سمیت و عوارض جانبی داروها استفاده می‌کنند [۲]. گیاه زوفا گیاهی است پایا از تیره‌ی نعناعیان که به حالت خودرو می‌روید. انسان این گیاه مشابه انسان نعناع است و مصرف طبی دارد [۳]. نام علمی این گیاه (*Hyssopus officinalis*) می‌باشد و به انگلیسی به آن "Hyssop" می‌گویند و از خانواده نعناعیان است [۴]. سرشاخه‌های گلدار این گیاه جزو اندام دارویی آن حساب می‌شوند و عملکرد خلط‌آور و ضداغفونی کننده دارند [۵]. امروزه فرض می‌شود که سلول‌های توموری موادی ترشح می‌کنند که سبب جوانه زدن عروق قلبی و رگ‌زایی می‌شود [۶،۷]. مخصوصاً بر این باورند که حضور بیش از یک جهش درون سلول منجر به سرطان می‌شود [۸]. طبق مطالعه‌ای که توسط Sharma و همکاران با هدف بررسی سمیت خوارکی نانوذرات ZnO در موش‌های سفید آزمایشگاهی طی ۱۴ روز متوالی انجام شد، محققان دریافتند که مقدار سمیت نانوذرات به مقدار دوز و زمان بستگی دارد [۹]؛ که طبق این نتایج می‌توان از نانوذرات اکسید روی به منظور درمان

۱. گروه زیست‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
۲. گروه شیمی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

\* لشانی نویسنده مسئول؛

۳. گروه زیست‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
۴. تلفن: ۰۹۱۵۴۵۰۵۸۹۴؛ دوچرخه‌سواری: ۰۵۱۳۸۴۳۵۰۰.

- پست الکترونیک: mhomayouni6@gmail.com  
تاریخ پذیرش نهایی: ۱۳۹۸/۵/۲۸  
تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۲

سترزده به روش سبز از عصاره‌ی گیاه زوفا بر لاین سلولی سرطان کولون و ثانیاً بررسی اثر التهاب‌زاوی این نانوذرات می‌باشد که این میزان التهاب‌زاوی با افزایش میزان پروتئین پروکسی‌تونین خون مشخص می‌شود.

## مواد و روش‌ها

جهت تولید نانوذرات اکسید روی سترزده به روش سبز از عصاره‌ی گیاه زوفا، پودر استات روى از شركت سیگما و پودر خشک گیاه زوفا نیز از عطاری تهیه شد. از استات روى به عنوان منبع روی همراه با عصاره‌ی گیاه زوفا طبق پروتکل ستز به روش سبز انجام شد. به منظور بررسی اثر سمیت نانوذرات اکسید روی سترزده به روش سبز از عصاره‌ی گیاه زوفا بر سلول‌های سرطانی کولون از تست MTT استفاده شد. این روش براساس توانایی دهیدروژناز سلول‌های زنده برای تبدیل  $^{3-(4,5)}$ -دی‌متیل تیازول- $^{(y)-2}$  -۵- تترازولیوم برومید (MTT) از رنگ زرد به کریستال‌های آبی و ارغوانی غیر محلول MTT- فورمازان که توسط ایزوپروپانول استخراج شده و بر روی ریدر و در طول موج ۵۰۰ مشخص شده است. شدت تبدیل MTT به MTT در فورمازان، سطح کلّ فعالیت دهیدروژناز سلول را نشان می‌دهد. برای این منظور سلول‌های سرطانی رده‌ی سلولی HT29 در معرض غلظت‌های ( $^{250}, 125, 62/5, 31/2$  ماکروگرم بر میلی‌لیتر) نانوذره اکسید روی سترزده از گیاه زوفا قرار گرفت، دلیل انتخاب این غلظت‌ها بر طبق مطالعات انجام شده توسط سایر محققان بود و همچنین بر این اساس که در غلظت کمتر از  $^{31/2}$  میکروگرم بر میلی‌لیتر فاقد اثربخشی و در غلظت بیشتر از  $^{250}$  میکروگرم بر میلی‌لیتر دارای اثربخشی سوء می‌باشد؛ بنابراین محدوده‌ی غلظت‌های نامبرده دارای بهترین نتایج می‌باشد. پس از گذشت زمان  $^{24}$  ساعت از تیمار، مقدار فورمازان تشکیل شده  $^{4}$  ساعت پس از افزودن MTT در  $^{570}$  نانومتر با استفاده از دستگاه الایزا اندازه‌گیری شد [ $^{26,25}$ ]. جهت اندازه‌گیری پروتئین پروکسی‌تونین، تعداد  $^{20}$  سرموش سفید نر نژاد بالب سی، با وزن حدوداً بین  $^{25}$  تا  $^{30}$  گرم از خانه‌ی حیوانات مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی مشهد تهیه شد و به اتاق حیوانات و آزمایشگاه زیست‌شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منتقل گردید. موش‌ها در قفس‌های مخصوص در شرایط کنترل شده (درجه حرارت  $^{22\pm 1}$  درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  $^{10\pm 6}$  درصد، نور  $^{12}$  ساعت روشناهی و  $^{12}$  ساعت تاریکی) با دسترسی آسان به آب و غذای کامل نگهداری شدند. موش‌ها به طور تصادفی به  $^{4}$  گروه پنج تایی تقسیم شدند. گروه  $^{1}$  به عنوان

سرطان استفاده نمود. بیوستز سبز نانوذرات ZnO ساده، قابل قبول و مقرون به صرفه است [ $^{11,10}$ ] و عملکرد بالای فیزیکی، در مقایسه با NP‌های دیگر مانند نقره، طلا، تیتانیوم و نیکل سندرم دارد [ $^{13,12}$ ]. پاسخ التهابی سیستمیک در اثر آزاد شدن اندوتوكسین‌های گرم منفی از عفونت‌های اورولوژیک یا گواراشی ایجاد می‌شود [ $^{14}$ ]. بیومارکر Procalcitonin (PCT) در حال حاضر به طور گسترده‌ای در اروپا برای تشخیص و ارزیابی پاسخ التهابی سیستمیک (SIRS) و سپسیس (Sepsis) به کار می‌رود [ $^{15}$ ]. برخی از سلول‌های تیروئید به نام سلول‌های C یا سلول‌های پاراگلیکولار، هورمونی پروتئینی به نام کلسی‌تونین را ترشح می‌کنند که برخلاف هورمون پاراتیروئید (PTH) غلظت خونی کلسیم را کاهش می‌دهد [ $^{16}$ ]. هورمون کلسی‌تونین از غده‌ی تیروئید ترشح می‌شود و با کاهش تجزیه و برداشت کلسیم از استخوان‌ها موجب کاهش کلسیم خون می‌شود [ $^{17}$ ]. به نظر می‌رسد هورمون کلسی‌تونین با توجه به تأثیرات استخوانی آن یعنی مهار فعالیت سلول استئوکلاست و فعال کردن سلول استئوبلاست، تأثیرات مهمی در ترمیم استخوان به خصوص ستون فقرات داشته باشد [ $^{18}$ ]. PCT در واقع پر و هورمون یا پیش‌هورمون کلسی‌تونین است. کلسی‌تونین به طور انحصاری توسط سلول‌های C غده‌ی تیروئید در پاسخ به تحریک هورمونی تولید می‌شود. PCT پلاسما شاخصی از پاسخ التهابی بدن انسان به یک عفونت غیر ویروسی است. افزایش PCT نشان‌دهنده‌ی قوی عفونت باکتریال با عوارض سیستمیک است [ $^{19}$ ]. اندوتوكسین‌های باکتری‌ها و سیتوکائین‌های پیش‌التهابی محرک‌های قوی برای تولید PCT می‌باشند [ $^{20}$ ]. پروتئین PCT دارای خواص جذب کننده‌ی لکوسیت‌ها بوده، تعديل تولید نیتریک اکسید توسط سلول‌های اندوتیال را بر عهده دارد [ $^{21}$ ]. کلسی‌تونین از طریق فیدبک منفی باعث کاهش کلسیم خون شده، بدین‌وسیله نقش عمدی در تنظیم غلظت کلسیم ایفا می‌کند [ $^{22}$ ]. این هورمون نفوذ‌پذیری سلول‌ها را نسبت به کلسیم کاهش داده فعالیت استئوکلاست‌ها را متوقف کرده از طریق وقفه در برداشت کلسیم از استخوان‌ها و تشید فعالیت استئوبلاست‌ها عمل استخوان‌سازی را تسهیل و تشید می‌کند [ $^{24,23}$ ]. طبق مطالعات فوق که توسط محققان در سال‌های متعدد انجام گرفته، مشخص شد میزان پروتئین پروکسی‌تونین در نتیجه‌ی شوک‌های عفونی افزایش می‌باید، البته در بیماران با سندرم‌های پاسخ التهابی سیستمیک غیر باکتریایی میزان PCT معمولاً کم است؛ نظر به این‌که ارزیابی سمیت نانوذرات از اولویت بالایی برخوردار می‌باشد، تصمیم به انجام پژوهشی در همین راستا گرفتیم. در واقع هدف از این مطالعه اولاً ارزیابی اثر سمیت نانوذرات اکسید روی

استفاده شد. نتایج در سطح ( $P < 0.05$ ), ( $P < 0.01$ ) از نظر آماری، معنی دار در نظر گرفته شد.

## نتایج


### نتایج حاصل از تست MTT

در این مطالعه سمیت سلولی القاشه بر ردهی سلولی سرطان کولون (HT-29) در تیمار با نانوذره اکسید روی سنتزشده توسط گیاه زوفا، ردهی سلولی Huvec به عنوان سلول نرمال در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده از این بررسی اثرات مهاری قابل توجه این نانوذرات را بر رشد سلول های سرطانی کولون نشان می دهد ( $P < 0.01$ ). درصد زیستایی سلول ها (IC<sub>50</sub>) به این صورت است که در طی زمان ۲۴ ساعت حدود ۵۰ درصد از رشد این سلول ها در غلظت حدوداً ۶۲ میکرو گرم / میلی لیتر مهار شدند. درواقع این درصد مهاری به نحوی بود که با افزایش غلظت، القای سمیت نانوذرات اکسید روی سنتزشده توسط گیاه زوفا روند افزایشی و کاهش درصد زیستایی سلول های سرطانی کولون را در پی داشت.

گروه کنترل (بدون دریافت نانوذرات) در نظر گرفته شد، گروه های ۲ و ۳ و ۴ به ترتیب دوزهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم هر ۲۴ ساعت ۱ میلی لیتر از سوسپانسیون نانوذرات اکسید روی به سیله ای گواژ به مدت ۲۰ روز دریافت کردند. درنهایت موش ها توسط کتابخانه و زایلازین قربانی و کالبدشکافی شده، خون گیری از دهلیز راست قلب انجام شد و با تحويل نمونه های خون به آزمایشگاه بالینی، میزان عفونت توسط سل کاتر به منظور تست پروتئین پروکسی توینی سنجیده شد. با دریافت کد اخلاق در آذرماه سال ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در این مجموعه تحقیق خود را آغاز نمودیم و کلیه کارها زیر نظر کمیته ای اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با کد اخلاق IR.IAU.MSHD.REC.1397.034 انجام گردید.

## آنالیز آماری

از نرم افزار SPSS جهت آنالیز داده ها استفاده گردید. برای بررسی نتایج حاصل از تست MTT، پروتئین پروکسی توینی و مقایسه میانگین عصاره های مختلف از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه ANOVA جهت مقایسه کلی و سپس از آزمون LSD




نمودار شماره ۱- بررسی درصد زیستایی ردهی سلولی سرطان کولون (HT-29) و ردهی سلولی نرمال (سلول های اندوتیال ورید بند ناف انسان) Huvec(HUVEC) در تیمار با غلظت های مختلف نانوذره اکسید روی سنتزشده به روش سبز از عصاره گیاه زوفا. داده ها در سطح ( $P < 0.01$ ), ( $P < 0.01$ ) از نظر آماری، معنی دار می باشد.

اکسید روی سنتزشده به روش سبز از عصاره گیاه زوفا، چنین برداشت می شود که با افزایش غلظت تیمار، میزان پروتئین پروکسی توینی نیز افزایش یابد.

نتایج حاصل از اندازه گیری پروتئین پروکسی توینی:

طبق نتایج بدست آمده از اندازه گیری پروتئین پروکسی توینی در نمونه خون گروه های مختلف تحت تیمار با نانوذرات



نمودار شماره ۲- بررسی میزان پروتئین پروکسی توینین در نتیجه تیمار موش‌ها با غلظت‌های مختلف نانوذرات اکسید روی سنتزشده به روش سبز از عصاره‌ی گیاه زوفا. داده‌ها در سطح ( $**P < 0.01$ ،  $***P < 0.001$ ) از نظر آماری، معنی‌دار می‌باشد.

بالا میزان حیات سلولی، کاهش زیادی را در مقایسه با غلظت‌های کمتر از خود نشان داد [۲۹]. در مطالعه‌ای دیگر که توسط Berardis Lovo نانوذره‌ی ZnO بر روی سرطان کولون رده‌ی سلولی انسانی صورت گرفت، نتایج این مطالعه نشان داد با افزایش غلظت این نانوذره، القای سمیت سلولی آن‌ها روند افزایشی دارد و باعث کاهش درصد زیستایی سلول‌های سرطانی می‌شود [۳۰]. نتایج این مطالعات با تحقیق حاضر که درمورد اثر نانوذرات اکسید روی مطالعات انجام شده، نانوذرات بهدلیل داشتن اثرات ضدسرطانی تولیدشده از عصاره‌ی گیاه زوفا بر لاین سلولی HT29 انجام شد، مطابقت داشت و افزایش غلظت نانوذره‌ی اکسید روی باعث کاهش درصد زیستایی سلول‌های سرطانی شد. با توجه به مطالعات انجام شده، نانوذرات بهدلیل داشتن اثرات ضدسرطانی [۳۱]، ضدتیکوپی [۳۲] و فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانتی [۳۳] مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، نانوذرات اکسید روی بهاطر خصوصیات منحصر به فرد نوری، کاتالیتیک و نیمه‌هادی به طور گسترده تولید می‌شوند و از نظر تکنولوژی کاربرد دارند. همچنین این نانوذره در برخی موارد سبب اثرات حفاظت‌شده می‌باشد و قادر است میزان سمیت برخی ترکیبات را کاهش دهد. از این ویژگی نیز در تحقیقات مختلف به منظور کاهش اثر سمیت برخی ترکیبات دارویی استفاده شده است [۳۴]. طبق مطالعه‌ای که توسط هوزیفا عمر و همکاران [۲۰۱۸] انجام شد، تأثیر نانوذرات اکسید روی بر تعداد سلول‌ها پس از دوره‌ی انکوباسیون ۲۴ ساعت نیز وابسته به غلظت بیشتر بود. کاهش شدید تعداد سلول MCF-7 و MDA-MB در یک روش وابسته به غلظت مشاهده شد و در غلظت ۱۰۰ میکروگرم در میلی‌لیتر تعداد سلول را با ۷۶/۸ درصد و

## بحث

گیاهان دارویی دارای ویتامین‌ها، ترپنئیدها و ترکیبات فنولی هستند که پتانسیل‌های آنتی‌اکسیدانتی دارند [۲۷]، نانوذرات سنتزشده با استفاده از گیاهان دارویی به عنوان داروهای پراکنده، فعالیت آنتی‌اکسیدانتی بیشتری در vitro نشان می‌دهد. سورست و همکاران گزارش کردند که نانوذرات اکسید روی با استفاده از Cassia fistula سنتز شده‌اند تا فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانتی قابل توجهی را با استفاده از رادیکال‌های ۱، ۱-دیفنیل-۲-پریکیل هیدرازیل (DPPH) نشان دهند. فعالیت‌های سیتوکسیک نانوذرات اکسید روی نشان‌دهنده اثر کشنده‌گی بر سلول‌های سرطانی می‌باشد که فعالیت سیتوکسیک را نشان می‌دهد [۲۸]. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثر سمیت نانوذرات اکسید روی سنتزشده به روش سبز از عصاره‌ی گیاه زوفا بر لاین سلولی سرطان کولون و اثر این نانوذرات بر پروتئین پروکسی توینین در نتیجه تیمار ۲۰ روزه‌ی موش‌ها انجام شد که نتایج حاصل از تست MTT نشان داد نانوذرات اکسید روی سنتزشده از گیاه زوفا خاصیت از بین بردن سلول سرطانی HT29 را دارد و IC<sub>50</sub> برای آن حدوداً ۶۲/۵ میکروگرم بر میلی‌لیتر گزارش شد. ملانوما تومور بدخیمی است که از ملانوسیت‌های پوست مشتاً می‌گیرد و این بیماری در مراحل اوّلیه‌ی جراحی قابل درمان است ولی با پیشرفت بیماری غیرقابل درمان می‌شود، مطالعه‌ی مهدوی راد و همکاران (۲۰۱۴) روی سلول‌های سرطانی ملانوما (A-375) نشان داد، با افزایش غلظت‌های اکسید روی اثرات ضدسرطانی قابل ملاحظه‌ای مشاهده شد. همچنین در ترکیب اکسید روی با نقره این روند کاهشی تناسب با غلظت نانوذرات دارد، به طوری که در غلظت‌های

نانوذرات اکسید روی دارای خاصیت ضدسرطانی بوده، از نظر تغییر در میزان پروتئین پروکسی توین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که در تیمار بلندمدت باعث افزایش پروکسی توین می‌شوند. بهطور کل فناوری نافو به توسعه تحقیقات و تکنولوژی در مقیاس اتمی، مولکولی و ماکرومولکولی اشاره دارد که منجر به دستکاری و مطالعه ساختارها و دستگاههای با مقیاس طول در محدوده ۱ تا ۱۰۰ نانومتر می‌شود. اشیا در این مقیاس، مانند «نانوذرات»، خواص و توابع جدیدی را که بهطور قابل توجهی از آن‌چه در مقیاس بزرگ دیده می‌شوند، می‌گیرند. اندازه‌ی کوچک، قابلیت سازگاری سطح، حلالیت بهبودیافته و چندمنظوره‌ی نانوذرات، بسیاری از روش‌های تحقیقاتی جدید را برای زیست‌شناسان باز می‌کنند. این زمینه به سرعت در حال رشد می‌تواند محققان متخصصی را قادر به طراحی و توسعه نانوذرات، چندمنظوره کند و می‌تواند به هدف، تشخیص و درمان بیماری‌های مانند سرطان کمک نماید [۴۱].

### نتیجه‌گیری

مطالعه‌ی حاضر نشان داد که نانوذرات اکسید روی سنتز شده به روش سبز از عصاره‌ی گیاه زوفا قادر به از بین بردن سلول‌های سرطانی کولون ۲۹ HT به‌طوری که IC<sub>50</sub> حدود ۶۲/۵ ماکروگرم بر میلی‌لیتر گزارش می‌شود؛ همچنین نتایج حاصل از تست پروتئین پروکسی توین نشان داد که نانوذرات اکسید روی بر پروتئین پروکسی توین اثر گذاشته، تا حد نسبتاً کمی منجر به افزایش میزان پروکسی توین می‌شود که البته بسته به میزان غلظت نانوذرات، نوع و زمان تیمار این میزان تغییر می‌کند؛ با توجه به این که PCT پروهormon یا پیش‌هormon کلیسی توین است و در شوک‌های عفونی در افراد میزان آن افزایش می‌یابد، پیشنهاد می‌شود تحقیقات بیشتری در مورد آن صورت پذیرد.

### تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از کلیه‌ی کسانی که در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد واحد علوم پایه و آزمایشگاه جهاد دانشگاهی مشهد که در انجام این طرح ما را یاری نموده‌اند، تشکر و قدردانی می‌گردد. تمامی نویسنده‌گان معیارهای استاندارد نویسنده‌گی براساس پیشنهادات کمیته‌ی بین‌المللی ناشران مجلات پزشکی را دارا بودند.

۸۰/۲ درصد به حداقل رساند. این یافته‌ها به عنوان یک تأیید برای اثر سیتوتوکسیک نانوذرات اکسید روی سنتز شده به روش سبز در نظر گرفته می‌شود [۳۵]. از مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق ما می‌توان به راحتی دریافت که نانوذرات اکسید روی سنتز شده به روش سبز از عصاره‌ی آبی گیاه زوفا دارای خاصیت سیتوتوکسیته بالایی هستند به‌طوری که در غلظت ۶۰ میکروگرم در میلی‌لیتر حدود ۵۰ درصد سلول‌های سرطانی HT29 را از بین بردن. در تحقیق حاضر، علاوه بر ارزیابی سمیت نانوذرات اکسید روی سنتز شده به روش سبز از عصاره‌ی گیاه زوفا، اثر این نانوذرات بر پروتئین پروکسی توین نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از تست خونی پروتئین در تیمار خوارکی موش‌ها با نانوذرات نشان داد که با افزایش میزان غلظت نانوذرات میزان پروتئین پروکسی توین نیز تا حدی افزایش می‌یابد که این تأثیرات علاوه بر غلظت نانوذرات، بسته به نوع تیمار و اندازه نانوذرات و زمان تیمار تغییر می‌کند؛ به‌طوری که در مطالعه‌ی انجام شده‌ی نانوذرات طلا توسط Lasagna-Reeves (۲۰۱۰) اشاره کرد که اثرات سمی دوزهای مختلف نانوذرات ۱۲ نانومتری طلا قادر به عبور از مایع خونی مغزی بودند و در بافت عصبی تجمع کردند و این تجمع بافت، به دوزهای مختلف تزریق بستگی داشت [۳۶]. PCT یک پروتئین پایدار در پلاسمما و نمونه‌های خون است و به عنوان یک نشانگر قابل تشخیص می‌باشد [۳۷] و در تشخیص مستقیم و دقیق سمیت سلولی ناشی از نانومواد کمک می‌کند [۳۸]. در تحقیقی که توسط Grissa و همکاران (۲۰۱۵) با نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر موش‌های تحت تیمار خوارکی به مدت ۶۰ روز انجام گردید، تجزیه و تحلیل هماتولوژیک افزایش قابل توجهی در WBC و PCT در دوزهای بالاتر را نشان داد [۳۹]. مطابق با این تحقیق، در تحقیق حاضر نیز در نتیجه تیمار خوارکی موش‌ها با نانوذرات اکسید روی سنتز شده از عصاره‌ی گیاه زوفا نتایج حاکی از افزایش کمی از پروتئین پروکسی توین را نشان داد. همچنین در مطالعه‌ای که توسط Kim و همکاران (۲۰۱۴) بر روی موش‌های صحرایی انجام دادند، در طول تیمار ۹۰ روزی موش‌ها با اکسید روی، در مقایسه فاکتورهای خونی نسبت با گروه کنترل متوجه کاهش سطح پلاکت‌ها، هماتوکریت و آلبومین به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه شاهد شدند و در میزان پروکسی توین تغییر چشمگیری را مشاهده نکردند [۴۰]. به عنوان تفسیر و ابهام‌زدایی، با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق و مقایسه نتایج مطالعات سایر محققان چنین برداشت می‌شود که

**References:**

- [1] Hassan H, Mansour A, Abo-Youssef A, Elsadek B, Messihia B. Zinc oxide nanoparticles as a novel anticancer approach; in vitro and in vivo evidence. *Clin Exp Pharmacol Physiol* 2017; 44(2): 235-43.
- [2] Xu D, Liu M, Zou H, Tian J, Huang H, Wan Q, et al. A new strategy for fabrication of water dispersible and biodegradable fluorescent organic nanoparticles with AIE and ESIPT characteristics and their utilization for bioimaging. *Talanta* 2017; 174: 803-8.
- [3] Khazaie H, Nadjafi F, Bannayan M. Effect of irrigation frequency and planting density on herbage biomass and oil production of thyme (*Thymus vulgaris*) and hyssop (*Hyssopus officinalis*). *Ind Crops Prod* 2008; 27(3): 315-21.
- [4] Mazzanti G, Battinelli L, Salvatore G. Antimicrobial properties of the linalol-rich essential oil of *Hyssopus officinalis* L. var *decumbens* (Lamiaceae). *Flavour Frag J* 1998; 13(5): 289-94.
- [5] Letessier M, Svoboda K, Walters D. Antifungal activity of the essential oil of hyssop (*Hyssopus officinalis*). *J Phytopathol* 2001; 149(11): 673-8.
- [6] Weidner N, Folkman J, Pozza F, Bevilacqua P, Allred EN, Moore DH, et al. Tumor angiogenesis: a new significant and independent prognostic indicator in early-stage breast carcinoma. *J Natl Cancer Inst* 1992; 84(24): 1875-87.
- [7] De Jong W, Borm P. Drug delivery and nanoparticles: applications and hazards. *Int J Nanomed* 2008; 3(2): 133-40.
- [8] Safari Chaleshtori J, Moradi MT, Farokhi E, Tabatabaee Far MA, Ghahfarrokhi T, Shayesteh F, et al. Detection of mutations in exons 5-8 of the P53 gene in gastric cancer samples using PCR-SSCP in Chaharmahal va Bakhtiari province 2006. *J Shahrekhord Univ Med Sci* 2009; 174:803-8. [in Persian]
- [9] Sharma V, Singh P, Pandey AK, Dhawan A. Induction of oxidative stress, DNA damage and apoptosis in mouse liver after sub-acute oral exposure to zinc oxide nanoparticles. *Mutat Res-Gen Tox En* 2012; 7(1): 84-91.
- [10] Belkhaoui C, Lefi R, Mzabi N, Smaoui H. Synthesis, optical and electrical properties of Mn doped ZnO nanoparticles. *J Mater Sci-Mater El* Materials in Electronics. 2018; 29(8):7020-31.
- [11] Wojnarowicz J, Omelchenko M, Szczytko J, Chudoba T, Gierlotka S, Majhofer A, et al. Structural and Magnetic Properties of CoMn Codoped ZnO Nanoparticles Obtained by Microwave Solvothermal Synthesis. *Crystals* 2018; 8(11): 410-5.
- [12] Vigneshwaran N, Kumar S, Kathe A, Varadarajan P, Prasad V. Functional finishing of cotton fabrics using zinc oxide-soluble starch nanocomposites. *Nanotechnology* 2006; 17(20): 5087-92.
- [13] Yadav A, Prasad V, Kathe A, Raj S, Yadav D, Sundaramoorthy C, et al. Functional finishing in cotton fabrics using zinc oxide nanoparticles. *Bull Mater Sci* 2006; 29(6): 641-5.
- [14] Ziegler EJ, Fisher Jr CJ, Sprung CL, Straube RC, Sadoff JC, Foulke GE, et al. Treatment of gram-negative bacteremia and septic shock with HA-1A human monoclonal antibody against endotoxin: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *N Engl J Med* 1991; 324(7): 429-36.
- [15] Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, et al. 2001 sccm/esicm/accp/ats/sis international sepsis definitions conference. *Intens Care Med* 2003; 29(4): 530-8.
- [16] Went PT, Lugli A, Meier S, Bundi M, Mirlacher M, Sauter G, et al. Frequent EpCam protein expression in human carcinomas. *Hum Patholog* 2004; 35(1): 122-8.
- [17] Tersmette M, Gruters R, De Wolf F, De Goede R, Lange J, Schellekens PT, et al. Evidence for a role of virulent human immunodeficiency virus (HIV) variants in the pathogenesis of acquired immunodeficiency syndrome: studies on sequential HIV isolates. *J Virology* 1989; 63(5): 2118-25.
- [18] Kharissova OV, Dias HR, Kharisov BI, Pérez BO, Pérez VMJ. The greener synthesis of nanoparticles. *Trends Biotechnol* 2013; 31(4): 240-48.
- [19] Unwin P, Unwin T. ICT4D: Information and communication technology for development. *Cambridge University Press*; 2009. 386.
- [20] Caws M, Thwaites G, Dunstan S, Hawn TR, Lan NTN, Thuong NTT, et al. The influence of host and bacterial genotype on the development of disseminated disease with *Mycobacterium tuberculosis*. *PLoS Pathogens* 2008; 4(3): e1000034.
- [21] Franceschi S, Herrero R, Clifford GM, Snijders PJ, Arslan A, Anh PTH, et al. Variations in the age-specific curves of human papillomavirus prevalence in women worldwide. *Int J Cancer* 2006; 119 (11): 2677-84.
- [22] Tai PT, Yu E, Winquist E, Hammond A, Stitt L, Tonita J, et al. Chemotherapy in neuroendocrine/Merkel cell carcinoma of the skin: case series and review of 204 cases. *J Clin Oncol* 2000; 18(12): 2493-9.
- [23] Clarke M, Lee P, Arora A, Villar R. Levels of metal ions after small-and large-diameter metal-on-metal hip arthroplasty. *J Bone Joint Surg Br* 2003; 85(6): 913-7.
- [24] Reinhart K, Bauer M, Riedemann NC, Hartog CS. New approaches to sepsis: molecular diagnostics and biomarkers. *Clin Microbiol Rev* 2012; 25(4): 609-704.

- [25] Orlova MA, Osipova EY, Roumiantsev SA. Effect of 67Zn-nanoparticles on leukemic cells and normal lymphocytes. *Brit J Med* 2012; 2(1): 21-7.
- [26] Veerman A, Pieters R. Drug sensitivity assays in leukaemia and lymphoma. *Brit J Haematol* 1990;74(4): 381-4.
- [27] Albrecht MA, Evans CW, Raston CL. Green chemistry and the health implications of nanoparticles. *Green Chem* 2006; 8(5): 417-32.
- [28] Ambika S, Sundrarajan M. Antibacterial behaviour of Vitex negundo extract assisted ZnO nanoparticles against pathogenic bacteria. *J Photochem Photobiol B* 2015; 146: 52-7.
- [29] Mahdavirad M, Najafzadeh N, Ali Niapour A, Jafari A. Cytotoxicity of ZnO and Ag/ZnO nano-composites on malignant melanoma cell line (A375). *Arak Med Univ J* 2014; 17(6): 74-83.
- [30] De Berardis B, Civitelli G, Condello M, Lista P, Pozzi R, Arancia G, et al. Exposure to ZnO nanoparticles induces oxidative stress and cytotoxicity in human colon carcinoma cells. *Toxicol App Pharmacol* 2010; 246(3): 116-27.
- [31] Li J, Guo D, Wang X, Wang H, Jiang H, Chen B. The photodynamic effect of different size ZnO nanoparticles on cancer cell proliferation in vitro. *Nanoscale Res Lett* 2010; 5(6): 1063-70.
- [32] Premanathan M, Karthikeyan K, Jayasubramanian K, Manivannan G. Selective toxicity of ZnO nanoparticles toward Gram-positive bacteria and cancer cells by apoptosis through lipid peroxidation. *Nanomed Nanotechnol* 2011;7(2): 184-92.
- [33] Das D, Nath B, Phukon P, Dolui S. Synthesis of ZnO nanoparticles and evaluation of antioxidant and cytotoxic activity. *Colloids Surf B: Biointerfaces* 2013; 111: 556-60.
- [34] Li LZ, Zhou DM, Peijnenburg WJ, van Gestel CA, Jin SY, Wang YJ, et al. Toxicity of zinc oxide nanoparticles in the earthworm, Eisenia fetida and subcellular fractionation of Zn. *Environ Int* 2011; 37(6): 1098-104.
- [35] Umar H, Kavaz D, Rizaner N. Biosynthesis of zinc oxide nanoparticles using Albizia lebbeck stem bark, and evaluation of its antimicrobial, antioxidant, and cytotoxic activities on human breast cancer cell lines. *Int J Nanomed* 2019; 14: 87-92.
- [36] Lasagna-Reeves C, Gonzalez-Romero D, Barria M, Olmedo I, Clos A, Ramanujam VS, et al. Bioaccumulation and toxicity of gold nanoparticles after repeated administration in mice. *Biochem Biophys Res Commun* 2010; 393(4): 649-55.
- [37] Claeys R, Vinken S, Spapen H, ver Elst K, Decochez K, Huyghens L, et al. Plasma procalcitonin and C-reactive protein in acute septic shock: clinical and biological correlates. *Crit Care Med* 2002; 30(4): 757-62.
- [38] Son S-W, Jeong SH. Nanomaterial-induced cytotoxicity detection composition and kit, and nanomaterial-induced cytotoxicity detection method. *Google Patents* 2015.
- [39] Grissa I, Elghoul J, Ezzi L, Chakroun S, Kerkeni E, Hassine M, et al. Anemia and genotoxicity induced by sub-chronic intragastric treatment of rats with titanium dioxide nanoparticles. *Mutat Res-Gen Tox En* 2015; 794: 25-31.
- [40] Kim Y, Park J, Lee E, Park S, Seong N, Kim J, et al. Toxicity of 100 nm zinc oxide nanoparticles: a report of 90-day repeated oral administration in Sprague Dawley rats. *Int J Nanomed* 2014; 9(2): 109-14.
- [41] McNeil SE. Nanotechnology for the biologist. *J Leukocyte Biol* 2005; 78(3): 585-94.