

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک واژینوز باکتریال در خانمهای باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد در سال ۱۳۸۳

افسانه تقریری^۱، آذر دانش^۲

خلاصه

سابقه و هدف: با توجه به وجود گزارش‌های مختلف مبنی بر ارتباط واژینوز باکتریال با زایمان زودرس، شیوع متفاوت این بیماری در خانمهای باردار کشورهای مختلف دنیا در مقایسه با مناطق ایران و عدم اطلاع از وضعیت اپیدمیولوژیک آن در شهرکرد، این تحقیق روی خانمهای باردار مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد در سال ۱۳۸۳ انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: این تحقیق به روش توصیفی روی ۲۱۰ خانم باردار صورت گرفت. پس از جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، مشاهده بالینی، آزمایش تعیین PH، لام مستقیم و تست ویف انجام شد و در نهایت نتایج با استفاده از آمارهای توصیفی ارائه گردید. متغیرها شامل میزان تحصیلات، شغل، شغل همسر، علایم بالینی، رنگ، بو و فرم ترشحات واژینال و یافته‌های لام مستقیم و تست ویف بودند.

یافته‌ها: میزان فراوانی واژینوز باکتریال در ۲۱۰ خانم باردار مورد بررسی ۲۸/۶ درصد (۶۰ نفر) بود. از بین خانمهای باردار آلوده، در ۵۳ نفر (۴/۸۸٪) ترشحات بدبو، نفر ۳۳ نفر (۰/۵۵٪) ترشحات زرد خاکستری، ۴۸ نفر (۰/۸۰٪) ترشحات آبکی، ۲۵ نفر (۰/۴۱٪) مقایبت دردنگ و ۱۱ نفر (۰/۱۸٪) سوزش واژن وجود داشت. در تمام این ۶۰ نفر، تست لام مستقیم از نظر واژینوز مثبت بود. ۲۹ نفر (۰/۴۸٪) از خانمهای باردار آلوده، تست ویف یا KOH مثبت داشتند یعنی طبق آزمونهای آماری تست ویف و لام مستقیم در تشخیص بیماری ارزش یکسان نداشته و نتیجه لام مستقیم با تست ویف ارتباط آماری معنی‌داری داشت. بین آلودگی به واژینوز باکتریال با ترشحات بدبو، مقایبت دردنگ، سوزش واژن و ترشحات زرد و خاکستری رنگ ارتباط معنی‌داری وجود داشت. شغل، میزان تحصیلات بیماران و شغل همسران با آلودگی ارتباط معنی‌داری نداشت.

نتیجه گیری: آلودگی به واژینوز باکتریال در این منطقه از ایران (شهرکرد) در حد بالایی قرار دارد. با توجه به ارتباط مطرح شده بین این بیماری و زایمان زودرس و عوارض و عواقب اجتماعی و فردی نوزادان نارس، پیشنهاد می‌گردد جهت کنترل و پیشگیری از بیماری و عوارض آن در بارداری، آموزش‌های لازم و توجه به رعایت مسائل بهداشتی صورت گیرد و تمامی خانمهای باردار منطقه از نظر این بیماری غربالگری شوند، در ضمن انجام مطالعات تحلیلی و تکمیلی برای تعیین ارتباط واژینوز باکتریال با زایمان زودرس توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: وضعیت اپیدمیولوژیک، واژینوز باکتریال، زن باردار، شهرکرد

۱- استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، گروه زنان و زایمان

۲- استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه زنان و زایمان

پاسخگو: دکتر افسانه تقریری

که شهرکرد، خیابان پرستار، بیمارستان آموزشی - درمانی هاجر، گروه زنان و زایمان

تراکم بی‌هوایها ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر شده و لاکتوپاسیل ها کاملاً از بین می‌روند.

از علل مطرح شده ای که موجب اختلال در فلور طبیعی واژن و افزایش باکتریهای بی‌هوایی می‌شود، قلیانی شدن واژن می‌باشد که چنین وضعیتی به خاطر مقایبت بیش از حد یا استفاده از دوش واژینال رخ می‌دهد (۱). در دوران بارداری ابتلا به واژینوز باکتریال، خانمهای باردار را از نظر پارگی زودرس

واژینوز باکتریال نوعی التهاب و عفونت واژن است که به

دلیل تغییر در فلور باکتریال طبیعی آن ایجاد می‌شود و موجب از بین رفتن لاکتوپاسیلهای مولد پراکسید هیدروژن و رشد مفرط تعداد زیادی از باکتریهای بی‌هوایی می‌شود (۱).

در فلور طبیعی کمتر از یک درصد خانمهای باکتری‌های بی‌هوایی وجود دارد (۱). در خانمهای مبتلا به واژینوز باکتریال

مقدمه

جمله زایمان زودرس و عوارض سوء فردی و اجتماعی نوزادان نارس، بروز می‌کند.

با عنایت به مطالعات و مطالب فوق، اهمیت بهداشتی و عوارض واژینوز باکتریال در حاملگی، لزوم شناسایی و درمان افراد آلوده و به منظور تعیین فراوانی آلودگی و بررسی علایم کلینیکی بیماری در زنان باردار، این مطالعه در سال ۱۳۸۳ در شهرکرد انجام پذیرفت.

مواد و روش ها

این تحقیق یک مطالعه توصیفی است که طی آن با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی و با طیف ۹۸ درصد، تعداد ۲۱۰ خانم باردار از فروردین ۱۳۸۳ لغایت ۶ ماه مورد بررسی قرار گرفتند. زنان بارداری که با شکایت از ترشح واژینال مراجعه می‌کردند، مشروط به اینکه ۴۸ ساعت قبل از مراجعه آنتی بیوتیک و یا دوش واژینال استفاده نکرده بودند وارد مطالعه می‌شدند. بعد از جلب رضایت بیمار، مصاحبه با او و جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، معاینه فیزیکی انجام می‌شد بدین ترتیب که با سرنگ استریل، ترشحات واژینال از دیواره‌های واژن و فورنیکس خلفی جمع‌آوری و مقداری از آن، روی کاغذ مخصوص متراخته شده و تعیین PH می‌گردد. سپس ۱-۲ قطره KOH داخل سرنگ Whiff می‌شود که در صورت متصاعد شدن بوی آمین، تست آزمایشگاهی توسط کارشناس مثبت تلقی می‌گشت. با یک اسپیچولا نیز مقداری از ترشحات، روی لام شیشه‌ای خشک کشیده و پس از فیکس کردن با حرارت چراغ الکی و رنگ‌آمیزی گرم مشاهده سلولهای clue زیر میکروسکوپ صورت می‌گرفت. تستهای آزمایشگاهی توسط کارشناس آزمایشگاه انجام می‌شد. اطلاعات مربوط به افراد از قبیل: شغل، شغل همسر، سن و میزان تحصیلات از روش مصاحبه در پرسشنامه ثبت گردید و پس از استخراج اطلاعات و کدبندی آنها وارد رایانه شد. آنگاه آنالیز آماری با سیستم SPSS صورت گرفت. از آزمونهای آماری، کاپا و کای دو هم استفاده شد. متغیرها شامل مشخصات دموگرافیک (سن، میزان تحصیلات، شغل و شغل همسر) میزان ترشح واژینال (کم، متوسط، زیاد) رنگ ترشح واژینال (زرد تا خاکستری، سبز یا سفید) فرم ترشحات (آبکی، پنیری یا یکنواخت) عالیم بالینی (مقاربت دردنگ، سوزش واژن) بوی ترشحات (بی بو یا بدبو) گسترش مرتبط (مثبت یا منفی) تست ویف (مثبت یا منفی) و PH ترشحات (کمتر از ۵ و بیشتر یا مساوی^۵) بودند.

پرده‌های جنبی، زایمان زودرس، کوریوآمبیونیت و آندر تریت پس از سزارین در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد (۱و۲).

زایمان زودرس، به تولد شیرخوارانی با سن ۳۷ هفته حاملگی یا کمتر گفته می‌شود که انسیدانس ۱۰-۱۵ درصد دارد (۳). عوارض زایمان زودرس، که یکی از علل مادری آن، ابتلا به واژینوز باکتریال در حاملگی است شامل مرگ و میر نوزادان و کاهش کیفیت زندگی آئینه آنها از نظر جنبه‌های فیزیکی، عقلانی و تواناییهای رشدی می‌باشد (۲). لذا با توجه به موارد فوق بر آن شدید تا به بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک یکی از علل زایمان زودرس در منطقه شهرکرد پیردازیم.

شیوع واژینوز باکتریال در بارداری ۱۰-۳۰ درصد گزارش شده است (۳). در کشور ماطی مطالعه‌ای که در مورد ارتباط واژینوز باکتریال با زایمان زودرس در شهر اصفهان و در سال ۱۳۷۵ صورت گرفت این میزان ۲۷/۸ درصد گزارش شد (۴). همینطور طی تحقیقی در کاشان در سال ۱۳۸۲ شیوع واژینوز باکتریال در خانمهای باردار ۲۸/۵ درصد گزارش گردید (۵). انسیدانس واژینوز باکتریال در سایر کشورها از جمله سوئد و دانمارک ۱۴ درصد بوده است (۶). دپارتمان زنان و مامایی آمریکا شیوع این بیماری را در خانمهای باردار در سال ۲۰۰۲، ۶۸ درصد گزارش کرده است (۲). همینطور در شهر لاھور پاکستان در سال ۲۰۰۴ از بین ۷۵ خانم باردار مورد بررسی ۱۴ نفر (۱۸/۷٪) مبتلا به واژینوز باکتریال بوده‌اند (۷). اختلاف آماری واضح بین شیوع این بیماری در کشورهای مختلف دنیا با ایران، محرك دیگری برای بررسی شیوع این بیماری شد.

عالیم بالینی عفونت حاد شامل ترشحات واژینال کم تا متوسط با بوی نامطبوع، رنگ زرد تا خاکستری بهمراه حبابهای کوچک حاوی مقادیر اندک لکوسیت می‌باشد.

تشخیص ابتلا به واژینوز باکتریال بر اساس عالیم بالینی، بوی نامطبوع واژن، رنگ خاص و $PH \geq 4-4/5$ ترشحات واژن و بالاخره انجام تست مربوط و تست ویف می‌باشد. گفتنی است کشت ترشحات واژن به دلیل آنکه اختصاصی نیست توصیه نمی‌شود (۱).

درمان انتخابی این بیماری مترونیدازول می‌باشد که موجب مهار بیهوایها می‌شود ولی مصرف آن در سه ماهه اول بارداری تراویث است (۸). در حال حاضر درمان خانمهای باردار مبتلا، بدون تشخیص آزمایشگاهی صورت می‌گیرد، لذا عوارض جانبی دارو در بارداری رخ می‌دهد. همچنین با مصرف بی‌رویه داروها مقاومت دارویی ایجاد می‌شود. از سوی دیگر در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع بیماری، عواقب بد بارداری از

مقایسه دردناک بودند و PH ترشحات واژن نفر (%)
بیشتر یا مساوی ۵ بود. (جدول ۴)

جدول ۴- توزیع فراوانی باکتریال با علائم و یافته های بالینی در خانمهای باردار مراجعه کننده به مرکز درمانی شهرکرد در سال ۱۳۹۳

جمع		نادرد	دارد	بالینی	علائم	واژینوز باکتریال
۷۳ (۳۴/۷)	۲۰ (۱۳/۴)	۵۳ (۸۸/۴)	بلی	وجود		
۴۳ (۲۰)	۳۶ (۲۴)	۷ (۱۱/۶)	گاهی	ترشحات		
۹۴ (۴۵/۳)	۹۴ (۶۲/۶)	۰ (۰)	منفی			
۲۱۰ (۱۰۰)	۱۵۰ (۷۱/۴)	۶۰ (۲۸/۶)	بدبو	جمع		
۳ (۱/۴)	۲ (۱/۳)	۱ (۱/۷)	سبز			
۲۰۷ (۹۸/۶)	۱۴۸ (۹۸/۶)	۵۹ (۹۸/۳)	زرد	رنگ		
۲۱۰ (۱۰۰)	۱۵۰ (۷۱/۴)	۶۰ (۲۸/۶)	خاکستری	ترشحات		
۶۵ (۳۱)	۴۶ (۳۱)	۱۹ (۳۱/۶)	بلی	سوزش		
۱۴۵ (۶۹)	۱۰۴ (۶۹)	۴۱ (۷۶/۴)	خیر	واژن		
۲۱۰ (۱۰۰)	۱۵۰ (۷۱/۴)	۶۰ (۲۸/۶)	جمع			
۷۷ (۳۱/۹)	۳۴ (۲۲/۶)	۳۳ (۵۵)	بلی	مقایسه		
۱۴۳ (۷/۱)	۱۱۶ (۷۷/۴)	۲۷ (۴۵)	خیر	دردناک		
۲۱۰ (۱۰۰)	۱۵۰ (۷۱/۴)	۶۰ (۲۸/۶)	جمع			
۱۸۰ (۵۸/۷)	۱۴۸ (۹۸/۶)	۳۲ (۵۳/۴)	۵<	PH		
۳۰ (۱۴/۳)	۲ (۱/۴)	۲۸ (۴۷/۴)	۵>	ترشحات		
۲۱۰ (۱۰۰)	۱۵۰ (۷۱/۴)	۶۰ (۲۸/۶)	جمع			
۱۷۰ (۸۱)	۱۲۲ (۸۱/۳)	۴۸ (۸۰)	آبکی			
۲۱ (۱۰)	۱۷ (۱۱/۴)	۴ (۷۶)	پنبیری	فرم		
۱۹ (۹)	۱۱ (۷/۳)	۸ (۱۳/۴)	یکنواخت	ترشحات		
۲۱۰ (۱۰۰)	۱۵۰ (۷۱/۴)	۶۰ (۲۸/۶)	جمع			

* تعداد و (درصد) می باشد.

از نظر آماری واژینوز باکتریال با ترشحات بدبو و سوزش واژن و مقایسه دردناک و PH ترشحات بیشتر یا مساوی با ۵ و رنگ ترشحات زرد خاکستری ارتباط معنی داری داشت. از میان خانمهای باردار آلوده به واژینوز باکتریال ۴۸ نفر (۸۰٪) دارای فرم ترشحات آبکی، ۴ نفر (۶/۶٪) فرم پنبیری و ۸ نفر (۱۳/۴٪) ترشحات یکنواخت بودند که از نظر آماری بین با واژینوز باکتریال و فرم ترشحات آبکی ارتباط معنی داری وجود نداشت. تمامی خانم باردار آلوده لام مستقیم مثبت داشتند در حالیکه فقط در ۲۹ نفر (۳٪) از آنها تست ویف مثبت بود یعنی تست ویف و لام مستقیم در تشخیص واژینوز باکتریال ارزش یکسان نداشته و ارتباط معنی داری بین نتیجه لام مستقیم (آلوده) به واژینوز باکتریال با تست ویف وجود داشت ($P < 0.05$). بر این اساس حساسیت تست لام مستقیم برای تشخیص واژینوز باکتریال بین ۹۷-۸۹ درصد می باشد.

بحث

یافته ها

این تحقیق روی ۲۱۰ خانم باردار انجام گرفت که ۶۰ نفر آنها (۲۸/۶٪) مبتلا به واژینوز باکتریال بودند. ۵۷ نفر (۹۵٪) از افراد دارای تحصیلات در حد دیپلم بودند، ۵۶ نفر (۹۳/۴٪) خانه دار و شغل همسر ۴۰ نفر (۶۷/۷٪) کارگر بود (جدول ۱ و ۲ و ۳).

جدول ۱- توزیع فراوانی واژینوز باکتریال و میزان تحصیلات در خانمهای باردار مراجعه کننده به مرکز درمانی شهرکرد در سال ۱۳۹۳

میزان تحصیلات		منفی	مثبت	مجموع
بی سواد و ابتدایی	۷۴ (۴۹/۳)	۲۸ (۴۶/۶)	*	۱۰۲
راهنمایی و دیپلم	۶۹ (۴۶)	۲۹ (۴۸/۴)		۹۸
دانشگاهی	۷ (۴/۷)	۳ (۵)		۱۰
جمع کل	۱۵۰ (۷۱/۴)	۶۰ (۲۸/۶)		۲۱۰ (۱۰۰)

* تعداد و (درصد) می باشد

جدول ۲- توزیع فراوانی واژینوز باکتریال بر حسب شغل در خانمهای باردار مراجعه کننده به مرکز درمانی شهرکرد در سال ۱۳۹۳

واژینوز باکتریال		شغل خود	مجموع	منفی	مثبت	مجموع
خانه دار	۱۳۸ (۹۲)	۵۶ (۹۳/۳)	۱۹۴ (۹۲/۳)			
غیرخانه دار	۱۲ (۸)	۴ (۶/۷)	۱۶ (۷/۷)			
جمع کل	۱۵۰ (۷۱/۴)	۶۰ (۲۸/۶)	۲۱۰ (۱۰۰)			

$P = 0.419$

* تعداد و (درصد) می باشد

جدول ۳- توزیع فراوانی واژینوز باکتریال بر حسب شغل همسر در خانمهای باردار مراجعه کننده به مرکز درمانی شهرکرد در سال ۱۳۹۳

واژینوز باکتریال		شغل همسر	مجموع	منفی	مثبت	مجموع
کارگر	۹۸ (۶۵)	۴۰ (۳۷)	۱۳۸ (۹۲)			
کارمند	۱۰ (۷/۶)	۸ (۱۳)	۱۸ (۸/۵)			
آزاد	۱۲ (۲۰)	۴۲ (۲۸/۴)	۵۴ (۲۵/۵)			
جمع کل	۱۵۰ (۷۱/۴)	۶۰ (۲۸/۶)	۲۱۰ (۱۰۰)			

$X^2 = 3/30.0$

$P = 0.192$

* تعداد و (درصد) می باشد

از نظر آماری بین آلوده به واژینوز باکتریال و مشخصات دموگرافیک افراد (سن، شغل، و شغل همسر و میزان تحصیلات) ارتباط معنی داری وجود نداشت. از این ۵۳ نفر، ۶۰ نفر (۹۸/۴٪) ترشحات زرد (۸۸/۶٪) دارای ترشحات بدبو و ۵۹ نفر (۹۳/۴٪) ترشحات زرد (۶۷/۷٪) دارای آلوده لام مستقیم بودند. از نظر علائم بالینی ۱۹ نفر (۳۱/۶٪) دچار سوزش واژن و ۳۳ نفر (۵۵٪) دچار خانمهای باردار آلوده دارند.

بدنی خاص در این دوران، عدم انجام مقاومت رضایتمدانه، محیط خشک وازن، کاهش میل جنسی در حاملگی و احساس خطر برای جنین باشد. در بین زنان باردار آلوده با نتیجه لام مستقیم مثبت، ۴۸ نفر (۸۰٪) فرم ترشحات آبکی داشتند که با نتایج تحقیق انجام شده در کاشان در سال ۱۳۸۲ (۷۳٪) مشابه دارد. از بین زنان باردار مبتلا ۳۲ نفر (۵۳٪) ترشحات وازن بیشتر یا مساوی با ۵ داشتند که مشابه رقم بدست آمده در تحقیقات انجام شده در بیمارستان *jinnah* لاہور می باشد.

نتیجه گیری

آلودگی به واژینوز باکتریال در این منطقه از ایران (شهرکرد) در حد بالایی قرار دارد، لذا با توجه به ارتباط مطرح شده بین این بیماری و زایمان زودرس و عوارض و عواقب اجتماعی و فردی نوزادان نارس، پیشنهاد می گردد جهت کنترل و پیشگیری از بیماری و عوارض آن در بارداری، آموزش‌های لازم در خصوص رعایت مسائل بهداشتی به خانمهای باردار صورت گیرد و تمامی خانمهای باردار منطقه از نظر این بیماری غربالگری شوند. در ضمن انجام مطالعات تحلیلی و تکمیلی برای تعیین ارتباط واژینوز باکتریال با زایمان زودرس نیز توصیه می شود.

تشکر و قدر دانی

بیدنوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بابت تشخیص ضرورت طرح و تأمین هزینه‌های اجرایی آن تشکر و قدر دانی می گردد.

در این تحقیق میزان فراوانی واژینوز باکتریال در خانمهای باردار ۲۸/۶ درصد به دست آمد که مشابه انسیدانسهای بدست آمده در سایر مناطق ایران مثل تحقیق خداکرمی در اصفهان در سال ۱۳۷۶ (۴) و کاظمینی در سال ۱۳۸۱ در کاشان (۵) است اما در مقایسه با تحقیق *Avlam* و همکاران در سال ۲۰۰۴ در پاکستان (۷) و تحقیق *Gregor* و همکاران در سال ۲۰۰۰ در سوئد و دانمارک (۶) تقریباً ۲ برابر و در مقایسه با تحقیق *Nabia* در سال ۲۰۰۲ در آمریکا (۲) نصف می باشد.

شغل همسر اکثر خانمهای باردار آلوده (۶۶٪) کارگر بود که احتمالاً بعلت وفور مشاغل داماداری و کشاورزی در این منطقه از کشور می باشد. از بین زنان آلوده ۵۳ نفر (۸۸٪) دارای ترشحات بدبو بودند. بین آلودگی به واژینوز باکتریال با ترشحات بدبو ارتباط معنی داری وجود داشت و این موضوع با نتایج بدست آمده در کتب مرجع که میزان فراوانی ترشحات بدبو را در واژینوز باکتریال ۵۰-۷۰ درصد گزارش نموده اند، همخوانی دارد (۹). ۱۹ نفر از افراد مبتلا (۳۱٪) دچار سوزش وازن و ۳۳ نفر (۵۵٪) دچار مقاومت دردناک بودند. ارتباط معنی داری بین آلودگی واژینوز باکتریال با سوزش وازن و مقاومت دردناک وجود داشت ولی این یافته با نتیجه تحقیقات *Lamb* و *Gosey* در سال ۱۹۹۸ که جهت بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک خانمهای مبتلا به واژینوز باکتریال (۱۰) انجام شد و همینطور کتب مرجع (۹) مغایرت دارد، چرا که در این تحقیقات سوزش وازن و مقاومت دردناک از عالیم نادر واژینوز باکتریال گزارش شده اند. شاید علت این تفاوت میزان بالای مقاومت دردناک به دلیل حاملگی، وضعیت

References:

1. Paula AH. Janathan SB. *Novak gynecobgy*. 5th ed. Lippincott Williams: 2002.
2. Nabia T. *Rapid diagnostic tests for bacterial vaginosis and its incidence in obstetrics*. Pak Armed Forces Med J. 2002; 52: 159-163.
3. Mercer BM. Goldenberg RL. *The preterm prediction study: A clinical risk assessment system*. Am J Obstet Gynecol. 1996 Jun; 174: 185-193
4. خداکرمی ناهید. ارتباط واژینوز باکتریال با زایمان زودرس در زنان باردار مراجعت کننده به درمانگاه و بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال ۱۳۷۴-۷۵. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ۱۳۷۶.
5. کاظمینی فرشته. بررسی تاثیر مترونیدازول در زنان باردار مبتلا به واژینوز باکتریال در جلوگیری از زایمان زودرس مراجعت کننده به بیمارستان شهید بهشتی شبیه خوانی کاشان در سال ۱۳۸۱. پایان نامه دکترای تحصیلی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان. ۱۳۸۱.
6. Me Gregor JA. French YI. *Bacterial vaginosis in pregnancy*. In: Hung N, Win E, John C, Hobbis S. (eds) *Clinical marernai-Feai iviedlcine*. Fadic publishing Group: 2000: 321-333.
7. Avlam N. Hafeez R. *Bacterial vaginosis in pregnant womanl A diagnostic approach*. Amn king Edward Med Coll. 2004; 10: 30-20.
8. Cunningham F. *Preterm Birth*. in: Cunningham F, Norman F, Gant k, etal. *Williams obstetrics*. 21th New York: MC graw and Hill company: 2003: 699-720.
9. Ruth E. Tumala M. *Gynecologic intations*. In: keneth G, Ryan A. *Kistner Gynecology and woman health*. 7th. Mosby company: 1999: 479-480.
10. Josey WE. Lambe DW. *Epidemiologic characteristics of woman infect with hemophilus vginesis*. Infectious Disease. 1998; 133-135.