

Evaluating the effect of oral bromelain (pineapple) on episiotomy wound healing in primiparous women

Golozar S^{1*}, Abbaspour Z¹, Namjouian F², Latifi SM³, Mirahi A¹

1- Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, I. R. Iran.

2- Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, I. R. Iran.

3- Department of Biostatistics, Faculty of Health, Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, I. R. Iran.

Received February 5, 2009; Accepted January 24, 2011

Abstract:

Background: Episiotomy is the most common perineal incision in midwifery to facilitate the expulsion of the fetus. Perineal damages cause disability in many normal daily activities. The purpose of this study was to determine the effect of bromelain on episiotomy wound healing in primiparous women.

Materials and Methods: In this double-blind clinical trial study, 82 primiparous women referred to Ahvaz Amiralmomenin hospital were randomly assigned to receive bromelain (100 mg) and placebo. The initial dose of bromelain was administered 2 hours after delivery. Tablets were given three times a day for six days. Wound healing was measured by REEDA scale on 3rd, 7th and 14th day after delivery. Data were analyzed using independent T-test, Chi-square and Mann-Whitney tests.

Results: The average scores of wound healing in bromelain group were significantly lower than placebo group on 3rd, 7th and 14th day after delivery ($P=0.001$). There was a significant difference in total wound healing between the two groups on 14th day after delivery ($P=0.001$).

Conclusion: Bromelain has a significant effect on better and faster healing of episiotomy wound. Hence, it can be used to accelerate episiotomy wound healing.

Keywords: Bromelain, Episiotomy, Wound healing

* Corresponding Author.

Email: golehr@ajums.ac.ir

Tel: 0098 935 568 6685

Fax: 0098 852 422 8400

IRCT Registration No. IRCT138810112952N1

Conflict of Interests: No

Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences, Summer, 2011; Vol. 15, No 2, Pages 84-90

Please cite this article as: Golozar S, Abbaspour Z, Namjouian F, Latifi SM, Mirahi A. Evaluating the effect of oral bromelain (pineapple) on episiotomy wound healing in primiparous women. Feyz 2011; 15(2): 84-90.

بررسی تأثیر برومیلن خوراکی (آنانس) بر بهبود زخم اپیزیاتومی در زنان نخست‌زا

سمیرا گلزار،^۱ زهرا عباسپور،^۲ فروغ نامجویان،^۳ سید محمود لطیفی،^۴ افروز میراهی^۵

خلاصه

سابقه و هدف: اپیزیاتومی شایع‌ترین برش جراحی در مامایی است که جهت تسهیل در خروج جنین انجام می‌شود. مشخص شده است که آسیب‌های پرینه باعث ناتوانی زنان در بسیاری از فعالیت‌های روزانه می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر برومیلن خوراکی بر بهبود زخم پرینه در زنان نخست‌زا می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، ۸۲ زن نخست‌زا مراجعت کننده به بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین شهر اهواز بسته‌های دارو (۱۰۰ میلی‌گرم برومیلن) و دارونما را به صورت تصادفی دریافت نمودند. دوز آغازین، ۲ ساعت پس از زایمان شروع شد. فریض‌ها سه بار در روز تا ۶ روز پس از زایمان تجویز شدند. میزان بهبودی زخم توسط مقایسه ریدا در روزهای ۷، ۳ و ۱۴ پس از زایمان اندازه گیری شده و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t مستقل، مجدول کای و من ویتنی آنالیز شدند.

نتایج: میانگین نمرات بهبود زخم در گروه برومیلن در مقایسه با دارونما در روزهای سوم، هفتم و چهاردهم پس از زایمان کمتر بود ($P=0.001$). همچنین، از نظر بهبودی کامل زخم در روز چهاردهم پس از زایمان، اختلاف معناداری بین دو گروه مشاهده شد ($P=0.001$).

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده اثربخشی برومیلن در بهبود بهتر و سریع‌تر زخم اپیزیاتومی می‌باشد. بنابراین، می‌توان از آن به عنوان تسریع کننده بهبود زخم اپیزیاتومی استفاده نمود.

واژگان کلیدی: برومیلن، اپیزیاتومی، بهبود زخم

فصلنامه علمی – پژوهشی فیض، دوره پانزدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰، صفحات ۸۴–۹۰

اگرچه در ایران آمار جامعی از اپیزیاتومی منتشر نشده، اما اپیزیاتومی شیوه معمول بیمارستان‌های ایران می‌باشد؛ به طوری که در بیمارستان حضرت ام البنین مشهد در سال ۱۳۸۴ میزان اپیزیاتومی در زنان نخست‌زا ۸۸/۳۱ درصد گزارش شده است [۱]. آسیب ناحیه پرینه بهدلیل درگیری عضلات آن می‌تواند در بسیاری از فعالیت‌های روزمره باعث ناراحتی فرد شود [۷، ۱]. همچنین، درد و ناراحتی ناشی از زخم پرینه، ایجاد ارتباط بین مادر و نوزاد را به تأخیر انداخته و حتی گاهی اوقات از ایجاد رابطه عاطفی بین آنها جلوگیری می‌کند [۸]. تأخیر در ترمیم زخم باعث افزایش خطر عفونت و نتایج بد آناتومیک شده و این عفونت می‌تواند منجر به بروز عوارض خطناک و حتی مرگ شود. شوک عفونی مخاطره‌آمیز با میزان کشنده‌گی ۱۰ تا ۱۵ درصد و فاسیت نکروزان کشنده هنوز هم با وجود نادر بودن در اثر عفونت محل اپیزیاتومی رخ می‌دهد [۴، ۹]. اقدامات زیادی پس از زایمان برای کاهش درد پرینه و تسریع بهبود زخم می‌توان انجام داد؛ از جمله رعایت بهداشت پرینه، خشک نگهداشتن محل زخم، همچنین، استفاده از درمان‌های مختلف که به دو صورت روش‌های دارویی و غیر دارویی می‌باشد [۹]. داروهای صناعی علی‌رغم داشتن کارآئی بالا اثرات نامطلوب بسیاری به همراه دارند. به همین دلیل امروزه بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار

مقدمه

یکی از مداخلات پزشکی در زایمان، اپیزیاتومی است [۱]. در واقع اپیزیاتومی شایع‌ترین عمل جراحی در مامایی است که برای عریض کردن راه خروجی واژن و کمک به خروج جنین در حین زایمان طراحی شده است [۳، ۲] و در زنان نخست‌زا به دلیل مقاومت پیشتر بافت‌ها، شایع‌تر است [۴]. شیوع اپیزیاتومی در سال ۲۰۰۳ طبق آمارهای موجود در کشورهای چین، آمریکای لاتین، برزیل، کنگو و هند در محدوده ۹۱–۱۰۰ درصد در زنان نخست‌زا گزارش شده است [۵].

۱ کارشناس ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۲ مریمی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۳ استادیار، گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۴ مریمی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۵ کارشناس مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

* نشانی نویسنده مسئول:

کنگاور، فرهنگیان، کوچه شهید طاهر آبادی، پلاک ۳۱

تلفن: ۰۸۵۲ ۴۲۲۸۴۰۰ - ۰۹۳۵ ۵۶۸۶۸۵

پست الکترونیک: golehr@ajums.ac.ir

تاریخ پذیرش نهایی: ۸۹/۱۱/۴

تاریخ دریافت: ۸۸/۱۱/۱۶

پلاستیک واژن و ابی‌زیاتومی مؤثرتر از دارونما نیافتند. با توجه به این که در مامایی مدرن توجه به استفاده از روش‌های درمانی غیرتهاجمی است و همچنین تأکید بر استفاده از مکمل‌ها و داروهای گیاهی با حداقل عارضه و مورد علاقه و قبول مردم و با عنایت به اینکه تاکنون در کشور ما مطالعه‌ای در زمینه خواص دارویی این میوه ارزشمند صورت نگرفته است، این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آناناس (بروملین) بر بهبود زخم ابی‌زیاتومی به انجام رسید.

مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور در بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین شهر اهواز در سال ۱۳۸۸ انجام گرفته است. پس از تصویب طرح پژوهشی در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اهواز، برومیلن از "شرکت بین‌المللی همراهان" خریداری شده و پس از فرمولاسیون توسط مشاور داروساز، دارو و دارونما به شکل قرص در آزمایشگاه صنعتی دانشکده داروسازی ساخته شدند. دارونما از مواد سازنده قرص‌های ماده دارویی (بروملین) ساخته شد. دوز برومیلن در هر قرص ۱۰۰ میلی‌گرم تعیین شده و بسته‌های دارو و دارونما توسط داروساز کدگذاری شدند. معیارهای ورود شامل حاملگی ترم، تحصیلات حداقل پنجم دبستان، ابی‌زیاتومی میانی طرفی، سن بین ۱۸ تا ۳۵ سال، جنین تک قلو با نمایش سر، نژاد ایرانی، ساکن شهر اهواز، وزن نوزاد بین ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ گرم، اندازه بدنی در محدوده ۱۹/۸-۲۶ بوده و معیارهای خروج شامل ابتلا به بیماری‌های مختلف کننده ترمیم زخم (دیابت، کلیوی، کم‌خونی، کبدی، سیستول و اضطراب پیش از حد)، مصرف داروهای مخدر و دخانیات، مصرف داروهای مؤثر بر بهبود زخم (گلکوکورتیکوئیدها، ضدانعقادها، سرکوب‌گرهای سیستم ایمنی، آنتی‌بیوتیک و شیمی درمانی)، خروج جفت با دست، پارگی زودرس پرده‌ها، ضایعات مقعد و فرج (زگیل تناصلی، هموروئید)، وجود خونریزی غیرطبیعی پس از زایمان، وجود آنومالی نوزادی یا تولد نوزاد مرده و غیرطبیعی بودن طول مرحله اول، دوم و سوم پس از زایمان بودند. در بد و ورود به زایشگاه ابتدا زنان واجد شرایط شناسایی شده و اهداف مطالعه برای آنان شرح داده شد، پس از جلب رضایت آگاهانه جهت شرکت در این مطالعه فرم انتخاب نمونه در مورد ایشان تکمیل و با توجه به معیارهای ورود و خروج، افراد واجد شرایط انتخاب شدند. پس از کامل شدن اتساع دهانه رحم و پیدا شدن ۳ الی ۴ سانتی‌متر از قظر سرجنین ابی‌زیاتومی میانی طرفی انجام شد. تمام موارد ابی‌زیاتومی و ترمیم

گرفته است [۱۰]. افزایش علاقه به استفاده از مکمل‌های دارویی سبب توجه بیشتر به فرآورده‌هایی شده است که از دیرباز به عنوان ترمیم کننده زخم در طب سنتی استفاده می‌شده‌اند [۱۱] یکی از این مکمل‌ها آناناس می‌باشد. آناناس (*Ananas Comosus*) حاوی فیتونوترینت‌ها، ویتامین C و ترکیبی به نام برومیلن (Bromelain) است. برومیلن از ریشه و میوه آناناس گرفته شده و با توجه به مطالعات آزمایشگاهی و بالینی خواص متعددی برای آن ذکر شده است [۱۲-۱۵]. مطالعات انسانی و حیوانی نشان‌دهنده اثرات سودمند برومیلن در کاهش درد، بهبود زخم و دربیدمان سوختگی و همچنین خواص ضد التهابی، ضد ادم و ضد انعقادی و مهار کننده تجمع پلاکتی می‌باشد [۱۲، ۱۴، ۱۵]. عمدۀ اثرات دارویی برومیلن مربوط به خواص پروتولیتیک آن است [۱۵، ۱۴، ۱۲]. مطالعات نشان داده‌اند که برومیلن خوراکی به صورت واپسی به دوز سبب کاهش سطوح برادی کنین، پلاسمایکین‌ها، پروستاگلاندین E2 و ترومبوکسان B2 در افراد مبتلا به التهاب می‌شود [۱۶، ۱۵]. در واقع برومیلن به صورت انتخابی ترومبوکسان را مهار کرده و نسبت ترومبوکسان به پروستاسایکلین را به نفع پروستاسایکلین ضد التهابی تغییر می‌دهد [۱۷]. بعلاوه، نشان داده شده است که برومیلن با تحریک لکوسیت‌ها سبب افزایش سطح ایترلوکین ۱، ۶، ۸ و فاکتور نکروز تومور آلفا در ناحیه التهابی می‌شود. افزایش سیتوکین‌ها به خصوص ایترلوکین ۸ منجر به جذب گرانولوسیت‌ها و مونوسیت‌ها به ناحیه التهابی و افزایش فعالیت فاگوسیتوزی و کمتوکسی می‌گردد [۱۹، ۱۸، ۱۵، ۱۲]. خواص ضد ادمی برومیلن به علت افزایش نفوذ پذیری عروقی به دنبال فیرینولیز و افزایش بازجذب مایع ادم در گردش خون می‌باشد. فعالیت فیرینولیتیک برومیلن به افزایش تبدیل پلاسمینوژن به پلاسمین نسبت داده شده است. پلاسمین نیز سبب شکستن فیرین شده و بدین ترتیب نفوذ پذیری عروقی افزایش پیدا می‌کند [۱۴]. نتایج یک مطالعه دوسوکور که به منظور بررسی اثر برومیلن بر شدت درد ابی‌زیاتومی زنان نخست زا انجام شد، نشان داد که میزان درد، ادم و التهاب در افراد درمان شده با برومیلن در مقایسه با گروه دارونما کمتر بوده و بهبود زخم در این افراد سریع‌تر اتفاق می‌افتد [۲۰]. Spencer و همکاران نیز بیان می‌دارند که مکمل تغذیه‌ای شامل برومیلن، تریپسین و پاپائین در ترمیم زخم موثر است [۱۱]. همچنین، نتایج یک مطالعه دیگر نشان داد که ترکیب برومیلن و تریپسین در بهبود زخم و کاهش ادم و التهاب کسانی که تحت اعمال لایاروتومی شکمی مازوئر قرار گرفتند، مؤثر است [۲۱]. در مقابل Lewis Howat و Cowie [۲۲] و همکاران [۲۳] در تحقیقات خود برومیلن را در بهبود زخم ناشی از جراحی

تحصیلات، شغل، شاخص توده بدنی، درآمد ماهیانه و خواسته بودن حاملگی) و اطلاعات زایمانی آنها (سن حاملگی، اتساع دهانه رحم در بدء پذیرش، مدت پارگی کیسه آب تا زایمان، نوع پارگی کیسه آب، طول مراحل اول و دوم لیبر، تعداد معاینات واژینال، مدت زمان شروع تا ختم ترمیم اپی زیاتومی، تعداد بخیه پوستی، استفاده از سنتو و وزن نوزاد) در جداول شماره ۱ تا ۳ آمده است. آزمون‌های آماری اختلاف معناداری را بین دو گروه از نظر متغیرهای فوق نشان ندادند. میانگین سنی واحدهای پژوهش 34.2 ± 7.7 سال بود و $91/4$ درصد افراد خانه‌دار بودند. همچنین، میانگین وزن نوزادان واحدهای پژوهش 3292 گرم بود. از نظر بهبود زخم، مقایسه میانگین نمرات بهبود زخم اپی زیاتومی در روز سوم، هفتم و چهاردهم پس از زایمان در گروه برومیلن و دارونما، آزمون من ویتنی اختلاف معناداری را بین دو گروه نشان داد ($P=0.001$): بدین ترتیب که میانگین این نمرات در روزهای فوق در گروه برومیلن کمتر بود (جدول شماره ۴). از نظر بهبود کامل زخم اپی زیاتومی در روز چهاردهم پس از زایمان، $51/2$ درصد افراد گروه برومیلن و $19/5$ درصد افراد گروه دارونما به بهبودی کامل دست یافتند. آزمون مجذور کای اختلاف معناداری را ($P=0.003$) بین دو گروه نشان داد (جدول شماره ۵). همچنین، از نظر عدم وجود درد پرینه در روز چهاردهم پس از زایمان، 78 درصد افراد گروه برومیلن و $53/7$ درصد گروه دارونما درد نداشتند که آزمون مجذور کای بین دو گروه اختلاف معناداری را ($P=0.02$) نشان داد (جدول شماره ۶). عوارض جانبی مشاهده شده بدین ترتیب بودند: یک نفر در روز هفتم پی‌گیری در گروه استفاده کننده از برومیلن با واکنش حساسیتی رو به رو شد، که به شکل کهیر در اندام‌ها و ناحیه شکم و کمر ظاهر شد. برای وی توسط متخصص داروی ضد حساسیت تجویز گردید. لازم بهذکر است با توجه به اینکه فرد مذکور تمام قرص‌ها را استفاده نموده بود، از مطالعه حذف نگردید.

بحث

یافته‌های این پژوهش نشان داد برومیلن در بهبودی زخم اپی زیاتومی در روزهای سوم، هفتم و چهاردهم مؤثر است. در یک مطالعه نشان داده شده است میزان ادم و التهاب در روزهای بستری در بیمارستان و پس از ۴ بار سنجش، در افراد استفاده کننده از برومیلن کمتر است که این نتایج با پژوهش حاضر هم خوانی دارد؛ در مطالعه مذکور 90 درصد افراد گروه برومیلن و 44 درصد افراد حاضر در گروه دارونما نمرات خوب و عالی را کسب کردند که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود [۲۰].

آن توسط افراد ثابتی که تحت نظارت پژوهشگر بودند، انجام شد. مدت زمان ترمیم اپی زیاتومی، اندازه برش و تعداد بخیه‌های پوستی ثبت شدند. سپس، بسته‌های دارویی (دارونما و برومیلن) کدگذاری شده، به طور تصادفی به خانم‌ها داده شد. نحوه تصادفی-سازی با استفاده از جدول اعداد تصادفی بود. استفاده از اولین دوز دارو توسط زائو، با نظارت پژوهشگر و پس از گذشت حداقل ۲ ساعت از زمان ترمیم اپی زیاتومی آغاز شد. به افراد توصیه شد که دارو را یک ساعت قبل از غذا یا دو ساعت پس از غذا سه بار در روز، به مدت ۶ روز استفاده کنند. دوز دارو با توجه به مطالعات مشابه و نظر متخصص فارماکوگنوزی تعیین شد. کلیه افراد در روزهای سوم، هفتم و چهاردهم پس از زایمان در ساعت ۸-۱۲ صبح به درمانگاه بیمارستان مراجعه کردند. میزان ترمیم زخم افراد توسط مقیاس ریدا [۲۴] در وضعیت لیتوتومی و با به کارگیری چراغ معاینه توسط پژوهشگر سنجیده شد. مقیاس ریدا شامل ۵ متغیر قرمزی، ادم، کبودی، ترشح و فاصله بین دو لبه زخم است. میزان قرمزی، ادم، کبودی و فاصله بین دو لبه زخم با استفاده از سواب با خودکار علامت گذاری شده و با خط کش اندازه گیری گردید. برای هر متغیر از صفر تا حداقل ۳ نمره در نظر گرفته شد. نمرات به دست آمده در هر متغیر باهم جمع شده و مجموع نمرات از حداقل $0-15$ در روزهای مذکور در جدول ثبت شدند. نمرات نهایی بالاتر نشان دهنده بهبود ضعیفتر زخم است. در هر ویزیت درجه دهانی گرفته شده و فرم مصاحبه و معاینه برای ایشان تکمیل گردید. همچنین، اندکس توده بدین افراد در روز 14 تعیین شد. کلیه معیارهای حذف از مطالعه، تا روز 14 پس از زایمان در نظر گرفته شد. افراد آزاد بودند که در صورت تمایل یا در صورت علایم عفونت محل زخم از مطالعه خارج شوند. اطلاعات جمع-آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 15 مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفتند. به منظور بررسی آمار توصیفی داده‌ها از شاخص‌های میانگین، انحراف معيار و فراوانی نسبی استفاده شد. جهت مقایسه، بررسی و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آ مستقل، مجذور کای و من ویتنی استفاده گردید.

نتایج

در این مطالعه 100 زن نخست‌زا به صورت تصادفی به طور مساوی در دو گروه دارو و دارونما قرار گرفتند. ۸ نفر به علت عدم مراجعته، 3 نفر به علت عدم دسترسی و 7 نفر به علت عدم همکاری از مطالعه حذف شدند. در مجموع 82 نفر در مطالعه تکمیلی شرکت داشتند (41 نفر در گروه دارو و بقیه افراد در گروه دارونما بودند). مشخصات دموگرافیک افراد (سن، سطح

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب برخی از مشخصات دموگرافیک

P	دارونما		مشخصات دموگرافیک
	تعداد (درصد)	DARO	
۰/۶۶۸	(۹۰/۲)۳۷	(۹۲/۶)۳۸	خانه دار
	(۹/۷)۴	(۷/۳)۳	شاغل
	(۱۷)۷	(۷/۳)۳	ابتدایی
۰/۵۶۷	(۱۹/۵)۸	(۲۶/۸)۱۱	راهنمایی
	(۴۶/۳)۱۹	(۵۳/۶)۲۲	متوسطه
	(۱۷)۷	(۱۲/۱)۵	عالی
۰/۶۲۳	(۸۳)۳۴	(۸۷/۸)۳۶	بلی
	(۱۷)۷	(۱۲/۲)۵	خیر
۰/۳۷۶	(۸۷/۸)۳۶	(۸۵/۳)۳۵	در حد کفاف
	(۱۲/۲)۵	(۱۴/۷)۶	در آمد خانواده
			کم در آمد

جدول شماره ۲- مقایسه میانگین برخی از مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش به تفکیک گروه

P	دارونما		مشخصات دموگرافیک
	$\bar{X} \pm SD$	DARO	
$P=0/548$	۲۲/۴۶±۳/۸۲	۲۳/۹۷±۳/۴۲	سن
$P=0/967$	۲۲/۹۰±۱/۷۴	۲۲/۵۳±۱/۶۱	اندکس توده بدن

جدول شماره ۳- مقایسه میانگین برخی از اطلاعات زایمانی واحدهای پژوهش به تفکیک گروه

P	دارونما		اطلاعات زایمانی
	$\bar{X} \pm SD$	DARO	
۰/۹۳۸	۳۹/۳±۱	۳۹/۳±۰/۸۹	سن حاملگی
۰/۲۰۲	۲/۷±۱	۲/۸±۰/۶	اتساع دهانه رحم (پذیرش)
۰/۹۲۷	۳۶۵/۵۱±۲۷۹/۷۵	۴۱۱/۸۸±۲۷۶/۹۲	طول پارگی کیسه آب تا زایمان (دقیقه)
۰/۶۷۵	۴۲۶/۱۷±۲۰۰	۴۳۷/۳۸±۱۹۸/۳۲	طول مراحل زایمان
۰/۴۴	۳۳/۶۱±۲۶/۱۸	۳۷/۲۷±۳۰/۲۵	اول (دقیقه)
۰/۷۶۹	۷/۷±۲/۶	۸/۵±۲/۸	تعداد معاینات واژینال
۰/۶	۱۳/۲۹±۳/۷۹	۱۴±۴	مدت ترمیم ابی زیاتومی (دقیقه)
۰/۲۱۶	۵/۲۹±۱/۱۵	۵/۵۱±۱/۳۹	تعداد بخه های پوستی
۰/۵	۳۲۶۵±۳۲۴	۳۳۲۰±۳۶۷	وزن نوزاد (گرم)

جدول شماره ۶- توزیع فراوانی واحدهای پژوهش از نظر وجود درد

در روز چهاردهم پس از زایمان به تفکیک گروه

P	ندراد		گروه
	دارد	DARO	
(۰/۰۲)	(۲۲)۹	(۷۸)۳۹	دارو
	(۴۶/۳)۱۹	(۵۳/۷)۲۲	دارونما

نتایج مطالعه Cowie و همکاران نیز نشان داد، در طی ۲ بار پیگیری پس از جراحی های پلاستیک پرینه در روزهای ۵ و ۱۴ پس از عمل، درصد ادم، ترشح چرکی از ناحیه زخم و هماتوم در گروه دریافت کننده برومیلن در مقایسه با گروه دارونما کمتر است؛ اما این تفاوت ها از نظر آماری معنادار نبودند [۲۳] که این نتایج با پژوهش حاضر هم خوانی ندارد. شاید علت تفاوت این

جدول شماره ۴- مقایسه میانگین امتیاز بهبود زخم در روزهای

پیگیری به تفکیک گروه

P	دارونما		روز
	$\bar{X} \pm SD$	DARO	
۰/۰۰۱	۳/۵۵±۱/۲۶	۲/۶۲±۱/۱۷	سوم
۰/۰۰۶	۲/۹۰±۱/۶۲	۱/۹۵±۱/۲۲	هفتم
۰/۰۰۱	۱/۵۸±۱/۲۴	۰/۷۳±۰/۸۳	چهاردهم

جدول شماره ۵- توزیع فراوانی واحدهای پژوهش بر حسب بهبود کامل زخم در روز چهاردهم پس از زایمان به تفکیک گروه

P	دارونما		گروه
	تعداد (درصد)	DARO	
۰/۰۰۳	(۴۸/۸)۲۰	(۵۱/۲)۲۱	دارو
	(۸۰/۵)۳۳	(۱۹/۵)۸	دارونما

نشان داد از نظر عدم وجود درد نیز بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که درصد افرادی که در روز چهاردهم پس از زایمان درد ناحیه پرینه نداشتند در گروه برومیلن بیشتر از گروه دارونما بود [۷۸] درصد در مقابل ۵۳/۷ درصد). بیان شده است که درد ناحیه اپیزیاتومی بیشتر در اثر ادم و التهاب ناحیه به وجود می آید [۲۰]، شاید برومیلن توانسته است با کاهش ادم و التهاب در نتیجه بهبود سریعتر زخم، درد را تسکین بخشد. در یک مطالعه دیگر نیز به دنبال استفاده از برومیلن، روزهای درد ناشی از جراحی دندان از ۸ روز در گروه دارونما به ۵ روز در گروه برومیلن کاهش یافت [۲۶]. در مطالعه حاضر یک نفر در گروه استفاده کننده از برومیلن با حساسیت به شکل کهیر در اندامها و ناحیه شکم و کمر روبه رو شد. میزان کهیر با گذشت روزهای پس از زایمان بیشتر شده بود که می تواند بیانگر اثر وابسته به دوز برومیلن در ایجاد حساسیت باشد. سازمان غذا و دارو برومیلن را در زمرة مکمل های غذایی مجاز طبقه بنده نموده و سلامت آن را مورد تأیید قرار داده است [۱۵]. یک مطالعه بروز ۱/۸ درصد اسهال، اختلالات وضعیتی معده و عکس العمل آلرژیک را گزارش نموده است [۱۴] در مطالعه یک شرکت داروسازی، که عوارض جانبی برومیلن را در طی ۷ سال بررسی کرد، تنها ۸ مورد عوارض جانبی از قبیل کهیر و اگزما در ۳/۵ میلیون قرص فروخته شده دیده شد [۱۲].

نتیجه گیری

در مجموع می توان چنین استنباط نمود برومیلن خوراکی بر تسريع روند بهبود زخم اپیزیاتومی مؤثر می باشد. بنابراین، استفاده از آن، برای تسريع بهبود زخم پس از جراحی پیشنهاد می گردد. همچنین، به نظر می رسد انجام کارآزمایی های بالینی بیشتری به منظور بررسی اثر برومیلن بر روی بهبود زخم های جراحی با استفاده از روزهای متفاوت نیاز است.

تشکر و قدردانی

این پژوهش طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده و بدین وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز قدردانی می نمائیم. همچنین، از دانشکده داروسازی اهواز جهت ساخت دارو و ریاست محترم بیمارستان و پرسنل محترم بخش زایشگاه، زنان و درمانگاه زنان بیمارستان امیرالمؤمنین اهواز کمال تشکر را داریم.

References:

- [1] Moshkbid Haghghi M, Hoseini Z, Ebrahimi A, Haghani H.A study of effect of diclofenac supp. on

باشد که در این مطالعه، زنان با محدوده سنی ۴۹ و ۵۲ سال و سابقه حاملگی ۲ و ۳ بار وارد مطالعه شدند. افزایش سن یکی از علل مداخله گر جهت ترمیم زخم می باشد و سن بالا به دلیل وجود نقص در گردش خون و انعقاد، پاسخ های التهابی آهسته تر و کاهش فعالیت فیبرو بلاست ها همه مراحل بهبود زخم را تحت تأثیر قرار می دهد [۲۵]. نتایج مطالعه Lewis و Howat که به منظور بررسی تأثیر برومیلن در بهبود زخم پس از اپیزیاتومی مدیولترال در زنان نخست زا انجام شده بود، نشان داد بازگشت ادم و قرمزی تا روز ششم بعد از زایمان در کسانی که برومیلن دریافت می کردند، به خصوص در افرادی که ادم و التهاب شدیدی در ناحیه داشتند، نسبت به گروه دارونما سریع تر بود، اما این اختلاف از نظر آماری معنادار نشد [۲۶] که با پژوهش حاضر همسو نیست. شاید علت تفاوت در دوز مصرفی دارو در این مطالعه و پژوهش حاضر باشد. مطالعات نشان داده اند که برومیلن به صورت وابسته به دوز سبب کاهش ادم و التهاب و اثرات دارویی دیگر می شود [۱۵]. دوز برومیلن استفاده شده در پژوهش فوق ۱۶۰ میلی گرم در روز بود که در مقایسه با دوز مصرفی ۳۰۰ میلی گرمی برومیلن در پژوهش حاضر، کمتر است. نشان داده شده است استفاده از کتساز (برومیلن+تریپسین) باعث کاهش التهاب در محل زخم ناشی از اعمال لایاراتومی شکمی مازور در روزهای ۵ و ۱۰ پس از عمل می شود [۲۱]. و همکاران نشان دادند که زمان ترمیم زخم ۷۷ درصد نمونه ها تحت درمان با مکمل برومیلن، به طور معنی دار کمتر از زمان استفاده آنها از دارونما است. همچنین، زمان معمولی ترمیم زخم در هنگام استفاده از دارونما ۱۸ روز بود که در هنگام مصرف مکمل به ۱۵ روز رسید. بیشترین اختلاف ها در زمان ترمیم زخم بین مصرف دارونما و مکمل حتی به ۷ روز هم می رسید. به علاوه، التهاب و قرمزی مشاهده شده ناحیه زخم هنگام استفاده از مکمل کمتر بود [۱۱]. یافته های پژوهش حاضر نشان داد سرعت بهبودی زخم در افراد استفاده کننده از برومیلن بیشتر از افراد استفاده کننده از دارونما است؛ به طوری که درصد افرادی که در روز چهاردهم به بهبودی کامل دست یافتند در گروه برومیلن بیشتر از گروه دارونما بود ۵۱/۲ درصد در مقابل ۱۹/۵ درصد). Tassmann و همکاران نشان دادند استفاده از برومیلن خوراکی تورم، کبدی و زمان ترمیم را به دنبال جراحی دندان کاهش می دهد، در این مطالعه، زمان تورم از ۷ روز در گروه دارونما به ۳/۸ روز در گروه برومیلن کاهش یافت [۲۶]. یافته های پژوهش حاضر

perineal pain after delivery. *Iranian J Nurs Midwifery Res* 2000; 13(26): 21-5.

- [2] Thorp JM Jr, Bowes WA Jr. Episiotomy: can its routine use be defended? *Am J Obstet Gynecol* 1989; 160(5 Pt 1): 1027-30.
- [3] Cunningham FG, levento KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC, Wenstrom KD. Williams obstetrics. 22th ed. New York: McGraw Hill; 2005.
- [4] Daghigbin E. Comparison of lavender and honey ointment on episiotomy pain and wound healing in primiparous women [Thesis]. Ahwaz. Jondishapur University of Medical Sciences. 2007.
- [5] Kropp N, Hartwell T, Althabe F. Episiotomy rates from eleven developing countries. *Int J Gynecol Obstet* 2005; 91: 157-59.
- [6] Navabi Rigi SH, Abedian Z, Poorjavad M, Smaeli H. Comparing the effect of cooling jell pads and ice pack, after episiotomy on the intensity of perineal pain. *Tabibe Shargh* 2007; 9(1): 27-36. [in Persian]
- [7] Tork zahrani SH, Amirali Akbari S, Valaei N. Comparison of the effect of Betadine and water in episiotomy wound healing. *Feyz* 2001; 20(4): 80-5. [in Persian]
- [8] Murray ST, McKinney ES, Qorrie TM. Fundamental of maternal-newborn nursing. 3th ed. Saunders Co; 2002. p. 408-10.
- [9] Golmakani N, Rabiei Motlagh E, Tara F, Asili J, Shakeri MT. The evaluation of Zingiberaceae ointment on episiotomy wound healing in primiparous women. *Iranian J Obstet Gynecol* 2008; 11(4): 29-39.
- [10] Mahdavian M, Golmakan N, Mansoori A, Hosseinzade H, Afzalaghiae M. An intervention of effectiveness of oral Dill extracts on postpartum hemorrhage. *Iranian J Obstet Gynecol* 2001; 4(7,8): 19-26.
- [11] Spencer A, Coimbra M, Coberly D, Chao JJ, Rohrich RJ. Oral Nutritional Supplementation Accelerates Skin Wound Healing: A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Arm, Crossover Study. *Plast Reconstr Surg* 2004; 114: 237.
- [12] Bitange NT, Zhang W, Shi-ying X. Therapeutic application of pineapple proteases (bromelain): A Review. *Pak J Nutr* 2008; 7(4): 513-20.
- [13] Lotz-Winter H. On the pharmacology of bromelain: An update with special regard to animal studies on dose-dependent effects. *Planta Med* 1990; 56(3): 249-53.
- [14] Roger AO. Safety & Efficacy Report Bromelain. *Plast Reconstr Surg* 2006; 118(7): 1640-4.
- [15] Maurer HR. Bromelain: Biochemistry, pharmacology and medical use. *Cell Mol Life Sci* 2001; 58(9): 1234- 35.
- [16] Vellini M, Desideri D, Milanese A, Omini C, Daffonchio L, Hernandez A, et al. Possible involvement of eicosanoids in the pharmacological action of bromelain. *Arzneimittelforschung*. 1986; 36(1): 110-2.
- [17] Taussig SJ, Batkin S. Bromelain, the enzyme complex of pineapple (*Ananas comosus*) and its clinical application. An update. *J Ethnopharmacol* 1988; 22(2): 191-203.
- [18] Desser L, Rehberger A. Induction of tumor necrosis factor in human peripheral-blood mononuclear cells by proteolytic enzymes. *Oncology* 1990; 47(6): 475-7.
- [19] Desser L, Rehberger A, Paukovits W. Proteolytic enzymes and amylase in human peripheral blood mononuclear cells in vitro. *Cancer Biother* 1994; 9(3): 253-63.
- [20] Zatuchni GI, Colombi DJ. Bromelains therapy for the prevention of episiotomy pain. *Obstet Gynecol* 1967; 29(2): 275-8.
- [21] Emmanuel RE, Aloy EA. A prospective randomized trial of kotase (bromelain+trypsin) in the management of post operative abdominal wound at university of Nigeria teaching hospital enugu, Nigeria. *J Col Med* 2005; 10(2): 61-6.
- [22] Howat RCL, Lewis GD. The effect of bromelain therapy on episiotomy wounds: A double blind controlled clinical trial. *J Obstet Gynaecol Br Commonw* 1972; 79(10): 951-3.
- [23] Cowie DH, Fairweather DV, Newell DJ. A double-blind trial of bromelains as an adjunct to vaginal plastic repair operations. *J Obstet Gynaecol Br Commonw* 1970; 77(4): 365-8.
- [24] Pamela D, Hill RN. Psychometric properties of the REEDA. *J Nurse Midwifery* 1990; 35(3): 162-65.
- [25] Hekmatpoor D. Osule moraghebat az zakhm. Arak: Arak university of Medical Sciences; 1999. p. 1-40. [in Persian]
- [26] Tassmann GC, ZaFran IN, Zayon GM. A double blind crossover-study of plant proteolytic enzyme in oral surgery. *J Dent Med* 1965; 20: 51-4.