

بررسی رابطه حاملگی با دریافت غذایی و سطح سرمی کلسیم، فسفر، منیزیوم و ویتامین D

الهه عینی^۱، پروین میرمیران^۲، علی اصغر میرسعید قاضی^۳، فاطمه محمدی نصرآبادی^۴، فریدون عزیز^۵

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت رابطه کلسیم دریافتی و مواد ریز مغذی با سلامت جنین، نوزاد و مادر و به منظور تعیین میزان دریافت‌های تغذیه‌ای به وسیله فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم کلسیم، مطالعه حاضر روی زنان باردار با حاملگی طبیعی و گروه شاهد آنها انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه هم گروهی تاریخی تعداد ۱۰۱ خانم باردار از ۵ مرکز مراقبت‌های بارداری و زایشگاه‌های شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. ۹۴ خانم غیرباردار نیز به طور تصادفی از «مطالعه قند و لیپید تهران» بعنوان گروه شاهد انتخاب شدند. گروه مورد و شاهد از نظر سن، وزن و BMI یکسان‌سازی شدند. پرسشنامه طرح شامل اطلاعات دموگرافیک، فرم دو روز یادآمد مواد غذایی و پرسشنامه تکرر مصرف، توسط متخصصین تغذیه با مصاحبه حضوری تکمیل گردید. یک نمونه خون برای اندازه‌گیری سطح سرمی کلسیم، منیزیوم، فسفر و ویتامین D اخذ گردید. داده‌های تغذیه‌ای توسط نرم‌افزار Nutritionist III انجام و داده‌ها با جدول (DRI Dietary Reference Intake) در گروه زنان غیرباردار مورد مقایسه قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری *t test* استفاده گردید.

یافته‌ها: میانگین دریافت روزانه منیزیوم، کلسیم، فسفر و ویتامین D به ترتیب 183 ± 79 ، 859 ± 388 ، 1009 ± 398 میلی‌گرم و $39 \pm 0/34$ میکروگرم بود. میانگین دریافت روزانه منیزیوم، کلسیم، فسفر و ویتامین D طی بارداری در مقایسه با مقادیر توصیه شده DRI به ترتیب $7/5$ و 100 درصد کاهش نشان می‌داد که این تفاوت با $P < 0/001$ در مورد منیزیوم، فسفر و ویتامین D و با $P < 0/01$ در مورد کلسیم معنی‌دار بود. دریافت روزانه منیزیوم، کلسیم و فسفر در زنان باردار در مقایسه با زنان غیرباردار بالاتر می‌نمود. این تفاوت با $P < 0/001$ معنی‌دار بود. تفاوتی در میزان دریافت ویتامین D در دو گروه مشاهده نگردید. میانگین سطح سرمی کلسیم، فسفر و ویتامین D به ترتیب $0/6$ ، $9/1 \pm 4/0$ میلی‌گرم در دسی‌لیتر و $24/3 \pm 14/1$ نانوگرم بر میلی‌لیتر بود. که با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری نداشت. تفاوت میانگین سطح سرمی منیزیوم گروه مورد $2/2 \pm 0/2$ و گروه شاهد $2/5 \pm 0/2$ میلی‌گرم در دسی‌لیتر با $P < 0/01$ معنی‌دار بود.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: دریافت روزانه ویتامین D، منیزیوم، کلسیم و فسفر و سطح سرمی آنان در زنان حامله تهرانی پائین است که نشان‌دهنده لزوم اجرای برنامه‌های مشاوره‌ای تغذیه‌ای برای این گروه از زنان می‌باشد.

کلمات کلیدی: کلسیم، فسفر، منیزیوم، ویتامین D، حاملگی، دریافت غذایی

• ۱- مری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، گروه زنان

• ۲- کارشناس ارشد تغذیه، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳/۹/۱

• ۳- دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه داخلی

تاریخ تایید مقاله: ۱۴/۳/۷

• ۴- کارشناس تغذیه، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه شهید بهشتی

• ۵- استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه تغذیه

• پاسخ گو: الهه عینی

کج تهران، اوین، بیمارستان طالقانی، طبقه دوم، مرکز تحقیقات غدد شهید بهشتی

مقدمه
زمینه ایجاد بیماری‌های متابولیک استخوانی در دوران

جنینی آغاز می‌گردد. ذخیره کلسیم ناکافی در دوران بارداری و

مقدمه

زنان در هر دو گروه مورد و شاهد از نظر سن، وزن و BMI یکسانسازی (Adjusted) شدند. سن، وزن و BMI در گروه مورد و شاهد به ترتیب 26.7 ± 0.5 ، 24.1 ± 0.3 سال، 61.7 ± 11.4 ، 59.2 ± 11.1 کیلوگرم و 24.6 ± 3.9 و 23.3 ± 4.4 کیلوگرم بر مترمربع بود. جدول شماره ۱، دریافت‌های غذایی زنان باردار در سه ماهه اول بارداری را در مقایسه با توصیه‌های DRI نشان می‌دهد کلیه دریافت‌ها در قیاس با میزان توصیه شده DRI پائین‌تر می‌باشد و این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌دار است. بالاترین کمبود دریافت در ویتامین D و سپس در منیزیم و کمترین کمبود دریافت در فسفر مشاهده می‌شود.

با استفاده از نرم‌افزار SPSS 10 آنالیز گردید، داده‌های تغذیه‌ای توسط نرم‌افزار Nutritionist III انجام شد و داده‌ها با جدول Dietary Reference Intakes for Vitamins and Minerals RDA or AI (DRI) (۷) مورد مقایسه قرار گرفت. میانگین و انحراف معیار متغیرها محاسبه و برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری *t test* استفاده شد.

یافته‌ها

جدول ۱- مقایسه دریافت‌های غذایی در ۱۰ زن باردار در سه ماهه اول بارداری با توصیه‌های DRI

متغیر (واحد)	دریافت روزانه	کمتر از ۷۵٪ DRI (درصد)	مقادیر DRI	مقادیر ۷۵٪ DRI
منیزیم	183 ± 79 mg	** (۸۶) ۹۲	۳۶۰ mg	۲۷۰ mg
کلسیم	859 ± 388 mg	* (۴۸) ۵۱	۱۰۰۰ mg	۷۵۰ mg
فسفر	1009 ± 398 mg	** (۸) ۸	۷۰۰ mg	۵۲۵ mg
ویتامین D	0.39 ± 0.34 μ g	** (۱۰۰) ۱۰۱	۵ μ g	۳/۵ μ g

* $P < 0.01$, ** $P < 0.001$

منیزیم سرمی در گروه مورد $2/2 \pm 0/2$ و در گروه شاهد $2/5 \pm 0/2$ می‌باشد که این تفاوت با $P < 0.01$ معنی‌دار است.

جدول شماره ۲، مقایسه میزان دریافت‌های غذایی را در زنان باردار و گروه شاهد نشان می‌دهد. میزان دریافت غذایی منیزیم، کلسیم و فسفر در گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بوده که این تفاوت با ($P < 0.001$) معنی‌دار است ولی دریافت ویتامین D در هر دو گروه تفاوتی ندارد.

جدول ۳- مقایسه شاخص‌های بیوشیمیایی خون در گروه مورد و شاهد

شاخص‌ها	مورد	شاهد
منیزیم (mg/dl)	$2/2 \pm 0/2^*$	$2/5 \pm 0/2$
کلسیم (mg/dl)	$9/1 \pm 0/6$	$8/9 \pm 0/6$
فسفر (mg/dl)	$4/0 \pm 0/6$	$3/8 \pm 0/6$
ویتامین D (ng/ml)	$24/3 \pm 14/1$	$23/0 \pm 12/9$

جدول شماره ۴، توزیع افراد با کمبود شدید، متوسط و طبیعی کلسیم و ویتامین D در دو گروه مورد و شاهد را نشان می‌دهد. میزان کلسیم در گروه مورد به ترتیب برای میزان‌های کمتر از $8/6$ ، $8/6-10/6$ و بیشتر از $10/6$ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر، ۱۹، ۷۷ و ۴ درصد و در گروه شاهد $3/5$ ، ۶۳ و ۲ درصد بود. میزان ویتامین D در گروه مورد به ترتیب در میزان‌های کمتر از 10 ، $10-20$ و بیشتر از 20 نانوگرم بر میلی‌لیتر، 19 ، 19 ، 20 و در گروه شاهد 15 ، 25 و 60 درصد بود. در گروه مورد نزدیک به یک پنجم و در گروه شاهد نزدیک به یک سوم افراد دچار کمبود شدید کلسیم می‌باشند. در گروه مورد یک پنجم و در گروه شاهد نیز نزدیک به یک پنجم افراد دچار کمبود شدید ویتامین D نیز می‌باشند.

جدول ۲- مقایسه میزان دریافت‌های غذایی در زنان باردار و گروه شاهد

متغیر (واحد)	دریافت‌های روزانه	مورد	شاهد
منیزیم (mg)	$183 \pm 79^*$	116 ± 45	
کلسیم (mg)	$859 \pm 388^*$	586 ± 202	
فسفر (mg)	$1009 \pm 398^*$	684 ± 191	
ویتامین D (μ g)	0.39 ± 0.34	0.29 ± 0.35	

جدول شماره ۳ مقایسه شاخص‌های بیوشیمیایی خون را در گروه مورد و شاهد نشان می‌دهد. میزان کلسیم، فسفر و ویتامین D سرمی در گروه مورد و شاهد تفاوت معنی‌داری ندارد. میزان

جدول ۴- مقایسه توزیع افراد با مقادیر مختلف سطوح سرمی کلسیم و ویتامین D در گروه مورد و شاهد.

ویتامین D (ng/ml)		کلسیم (mg/dl)		گروهها
>۱۰	۱۰-۲۰	<۱۰	>۱۰	
۵۶ (۶۰)	۲۴ (۲۵)	۱۴ (۱۵)	۴ (۴)	شاهد (n=۹۴)
۴۱ (۴۰)	۴۱ (۴۰)	۱۹ (۲۰)	۴ (۴)	مورد (n=۱۰۱)

* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده درصد می باشد

بحث

بررسی دریافت های غذایی در زنان باردار تهرانی نشان داد که میزان دریافت های غذایی حاوی ویتامین D، منیزیم، کلسیم و فسفر در مقایسه با میزان توصیه شده DRI پائین تر می باشد. دریافت های غذایی در گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود و شاخص های بیوشیمیایی در گروه مورد و شاهد جز در میزان منیزیم تفاوتی نداشت. این مطالعه نشان داد که در تهران زنان باردار کمتر از زنان شاهد از کلسیم و ویتامین D استفاده نمی کنند بلکه کمبود دریافت مربوط به همه زنان جامعه است. با توجه به اینکه بیشتر ویتامین D بدن از تبدیل کلسترول در سطح پوست حاصل می شود و ارتباط با تابش اشعه خورشید دارد، لذا دریافت غذایی نقش اصلی را دارا نیست و پائین بودن سطح ویتامین D در هر دو گروه به علت کمبود تماس با خورشید می باشد. عوامل متعددی در پی آمد حاملگی اثر دارند از جمله نقش تغذیه که اثرات آن در پی آمدهای بارداری مورد پذیرش متخصصین است (Brooke، ۶). در دو بررسی ارتباط بین فاکتورهای تغذیه ای را بر روی زنان آسیایی که دارای وضعیت نامناسبی از نظر ویتامین D بودند مورد توجه قرارداد. وی ارتباط بین فاکتورهای تغذیه ای از جمله گیاهخواری، و عدم دریافت ناکافی مواد غذایی بدلیل اعتقادات مذهبی و ممنوعیت مصرف پاره ای از مواد غذایی را از جمله دلایل کمبود ویتامین D ذکر کرده است (۸-۹). در مطالعه دیگری که Shany و همکارانش در زنان بودایی باردار و زنان یهودی انجام دادند نقش رژیم غذایی و اعتقادات مذهبی در نوع مواد غذایی مصرفی با میزان ویتامین D را نشان داده شد (۱۰). مطالعه دیگری که اثر رژیم غذایی در وضعیت ویتامین D زنان باردار پاکستانی مقیم اسلو را نسبت به زنان نروژی مورد توجه قرار داده بود، دلیل اصلی کمبود ویتامین D در این زنان را اجتناب از دریافت نور خورشید، دریافت ناکافی ویتامین D از راه تغذیه و عدم استفاده از مکمل ها عنوان کرده بود. استفاده زیاد فیتات توسط زنان پاکستانی دلیلی برای سوء جذب کلسیم عنوان گردیده است.

بنظر می رسد دریافت کلسیم ناکافی و اضافه دریافت فیتات منجر به تشدید مکانیسم کلسیم هموستازیس گردیده است. سایر منابع دریافت ویتامین D در این زنان محدود به استفاده از مارگارین بود و مصرف ماهی در این زنان پائین تر از زنان نروژی بود. کمبود کلسیم در اثر دریافت کم کلسیم یا در اثر دریافت فیتات زیاد در رژیم غذایی، کاتابولیسم ۲۵ هیدروکسی ویتامین D را در کبد افزایش می دهد و بدینوسیله احتیاج به ویتامین D افزایش می یابد. ترویج الگوی غذایی غربی در مهاجرین نیز اغلب منجر به افزایش دریافت چربی، شکر و کاهش دریافت غذایی گردیده است که با افزایش وزن (خصوصاً کاهش فعالیت بدنی منجر به افزایش بیماری های قلبی و عروقی، دیابت ملیتوس و مشکلات جدی در سلامتی مهاجرین مقیم شهرهای صنعتی شود (۵). در زنان کم سن و سال نیجریایی نیز کمبود ویتامین D به دریافت ناکافی مواد غذایی، عدم استفاده از مکمل ها و نور خورشید نسبت داده شده است. هیپوپاراتیروئیدیسم فیزیولوژیک هم به عنوان دلیلی برای افزایش ویتامین D در دوره بارداری مطرح شده است (۱۲-۱۱). در مطالعه تهران نشان داده شد که حدود ۷۵٪ از افراد مونث ۱۰ تا ۲۹ ساله دچار کمبود ویتامین D هستند و میانه سطح سرمی ویتامین D در تمام گروه های سنی به ویژه دختران و زنان ۴۰-۱۰ ساله پائین تر از ۲۵ ng/ml بود. در این مطالعه برای اصلاح کمبود ویتامین D آموزش افراد جامعه خصوصاً دختران و زنان برای استفاده از تابش اشعه خورشید بر پوست بدن در ساعاتی از روز پیشنهاد گردیده است (۲). اکثر مواد غذایی بجز روغن کبد ماهی و ماهی آزاد فاقد مقادیر کافی ویتامین D هستند. در نتیجه میزان ویتامین D دریافتی از راه مواد غذایی اندک است. کاهش مصرف لبنیات در جامعه ما سطح کلسیم مصرفی را کمتر از استانداردهای توصیه شده می کند. کمبود ویتامین D و کلسیم در دوران بارداری منجر به افزایش برداشت مواد معدنی از استخوان مادر و کاهش توده استخوانی وی می گردد که احتمال استئوپروز در دوران یائسگی را افزایش می دهد. این مطالعه نشان داد که کل

زنان تهرانی بدلیل کاهش دریافت ویتامین D و کلسیم دچار کمبود ویتامین D و کلسیم می‌باشند و این مساله ممکن است در زمان بارداری که نیاز به کلسیم بالا می‌رود، جهت سلامت مادر و جنین می‌گردد.

مخاطره‌آمیز باشد. لذا آموزش تغذیه، مشاوره تغذیه، و استفاده از مکمل‌ها و قرارگیری در نور آفتاب برای این گروه از زنان توصیه می‌گردد.

References:

- ۱- حسین‌پناه ف، هدایتی م، میرمیران پ، محرابی ی، عزیزی ف. سطح سرمی کلسیم، فسفر و آلومین در کودکان دبستانی ۲۳ دبستان کشور در سال ۱۳۷۵. مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران. پاییز ۱۳۸۰ سال سوم، شماره ۳: ۱۶۰-۱۴۷
- ۲- عزیزی ف، رئیس‌زاده ف، میرسعید قاضی ع ا. کمبود ویتامین D در گروهی از ساکنان شهر تهران. مجله پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی). زمستان ۱۳۷۹. سال ۲۴، شماره ۴: ۳۰۳-۲۹۱
- ۳- عینی ا، میرسعید قاضی ع ا، میرمیران پ، میربلوکی م، عزیزی ف. تغییرات کلسیم ویتامین D و سایر شاخص‌های بیوشیمیایی خون در طی بارداری. مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران. بهار ۱۳۸۲. سال پنجم، شماره ۱: ۵۱-۴۵
- ۴- عزیزی ف، آزادبخت ل، میرمیران پ، سعادت ن. بررسی کفایت رژیم غذایی بزرگسالان تهرانی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله پایش. تابستان ۱۳۸۲. سال دوم، شماره ۳: ۲۲۳-۲۱۵

- 5- Henriksen C, Brunvand L, Stoltenberg C, Trygg K, Haug E, Pedersen JI. **Diet and vitamin D status among pregnant Pakistani women in Oslo.** *Eur J Clin Nutr* 1995; 49:211-8
- 6- Kathleen Mahal. *Escott Stumps. Krause's food, nutrition & diet therapy. Chapter 7: Shabert J. Nutrition During pregnancy and lactation. 2004 11th edition. Saunders company, pp 183-213*
- 7- Kathleen Mahal. *Escott Stumps. Krause's food, nutrition & diet therapy. Chapter 15: Earl R. Guidelines for dietary planning, Determining nutrient needs formerly recommended dietary allowances. 2004 11th edition. Saunders company, pp 365-367*
- 8- Brooke OG, Brown IR, Bone CD, Carter ND, Cleeve HJ, Maxwell JD, Robinson VP, Winder SM. **Vitamin D supplements in pregnant Asian women: effects on calcium status and fetal growth.** *Br Med J.* 1980; 280: 751-4.
- 9- Brooke OG, Brown IR, Cleeve HJ, Sood A. **Observations on the vitamin D state of pregnant Asian women in London.** *Br J Obstet Gynaecol* 1981; 88:18-26.
- 10- Shany S, Biale Y, Zuili I, Yankowitz N, Berry JL, Mawer EB. **Feto-maternal relationships between vitamin D metabolites in Israeli Bedouins and Jews.** *Am J Clin Nutr* 1984; 40:1290-4
- 11- Sanchez PA, Idrisa A, Bobzom DN, Airede A, Hollis BW, Liston DE, Jones DD, Dasgupta A, Glew RH. **Calcium and vitamin D status of pregnant teenagers in Maiduguri, Nigeria.** *J Natl Med Assoc* 1997; 89: 805-11.
- 12- Pitkin RM. **Calcium metabolism in pregnancy and the perinatal period: a review.** *Am J Obstet Gynecol* 1985 Jan 1; 151: 99-109