

مقایسه اثرات آلومینیوم و کادمیوم بر پارامترهای مرتبط با فعالیت کبد

شیوا نجفی^{۱*}، مسیح ا... طاهر^۲، سیدعلی اصغر مشتاقی^۳

^۱ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان

^۲ دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان

^۳ استاد، گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان

* نویسنده مسئول: Shivanajafi7@Gmail.com

خلاصه:

سابقه و هدف: در مطالعه حاضر اثرات دو فلز آلومینیوم و کادمیوم بر روی پارامترهای فونکسیون کبد (فعالیت LDH, AST, ALT, غلظت بیلی روبین تام و پروتئین) در سرم موش های صحرانی با غلظت و زمان های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.

مواد و روش ها: نمک های آلومینیوم و کادمیوم با دوزهای مختلف به موش های صحرانی تزریق شد و پس از اتمام تزریق در زمان های معین، حیوانات کشته شدند و سرم خون آنها جمع آوری شد. غلظت آنزیم های کبدی با روش های معتبر آزمایشگاهی اندازه گیری شدند.

نتایج: اثرات آلومینیوم بر فعالیت LDH وابسته به غلظت و زمان بود. فعالیت آمینوترانسفرازهای AST و ALT افزایش کمتری را نسبت به نتایج اثرات کوتاه مدت آلومینیوم نشان داد. و افزایش غلظت بیلی روبین تام در سرم قابل ملاحظه بود، در صورتی که افزایش غلظت پروتئین در سرم ناچیز بود. در رابطه با کادمیوم، نسبت میزان افزایش فعالیت LDH در سرم وابسته به غلظت و زمان بود؛ به طوری که نتایج حاصل نشان می دهد که غلظت های کم کادمیوم، تغییرات شدیدتری را نسبت به آلومینیوم اعمال کرده است. غلظت بیلی روبین تام و پروتئین در سرم متناسب با افزایش غلظت کادمیوم و زمان تزریق افزایش یافته بود. در بررسی فعالیت آمینوترانسفرازهای AST و ALT مشخص شد که با افزایش غلظت کادمیوم این دو فاکتور افزایش یافته اند.

نتیجه گیری: به طور کلی آلومینیوم و کادمیوم هر دو برای سلول های کبدی سمی بوده و باعث تغییرات فیزیولوژیک و مورفولوژیک هپاتوسیت ها می گردند که افزایش این تغییرات تابع غلظت می باشد و در زمان های طولانی، افزایش تغییرات پارامترهای فونکسیون کبد در سرم قابل ملاحظه است.

واژگان کلیدی: آلومینیوم، کادمیوم، لاکتات دهیدروژناز، آسپاراتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، بیلی روبین تام

Comparing the effects of Aluminum and Cadmium on liver parameters

Najafi SH*, Taher M, Moshtaghi A

Department of Biochemistry, Faculty of Biology Sciences, Islamic Azad University, Falavarjan Branch, Falavarjan, I. R. Iran.

* Corresponding Author: shivanajafi7@gmail.com

Abstract:

Background: In this study, the effects of Aluminum and Cadmium on liver parameters (LDH, AST, ALT, serum bilirubin, total protein) in rat serum at various times have been studied.

Materials and Methods: Aluminum and cadmium salts in different doses were injected. After the completion of injection in different times, the animals were decapitated and the serum was used for liver enzymes.

Results: Aluminum effect on LDH was concentration- and time- dependent. The activity of aminotransferases AST, ALT showed less increase than the short-term effects of aluminum. The serum total bilirubin was significantly increased, whereas serum protein concentration is negligible. With regard to Cadmium, the increased activity of serum LDH was concentration- and time dependent. So, the lower concentrations of Cadmium had much more changes compared to Aluminum. Total bilirubin concentration and serum protein were similar to the increase in Cadmium concentration and the time of injection. The activity of aminotransferases AST, ALT was found to be increased by increase in the levels of cadmium.

Conclusion: In general, both Aluminum and Cadmium are toxic to hepatic cells and cause physiologic and morphologic changes in hepatocytes which are functions of concentration. In longer periods, the increase in hepatic parameters is significant.

Keywords: AL, Cd, LDH, AST, ALT, Total bilirubin