

## بررسی تاثیر افسردگی‌گاهی درمنه در مبتلایان به آسم

دکتر فریبرز منصور قناعی<sup>۱</sup>، سهیلا سیگارودی<sup>۲</sup>، دکتر حمید رضا مبشری<sup>۲</sup>، دکتر میر عباس جلیلی<sup>۲</sup>

### چکیده

**سابقه و هدف:** طب گیاهی از دیرباز در درمان بیماریها مطرح بوده است و در این زمینه تجربه هزاران ساله طب سنتی چین و ایران در دست است، اما اکثر این تجربه‌ها دارایی پیشوانه علمی نمی‌باشد. لذا مستدل کردن اثر این داروهای گیاهی طی مطالعات مدون و علمی به شدت احساس می‌گردد. در این تحقیق بر آن شدیدم تا اثر افسردگی‌گاهی درمنه را در بیماران آسمی به عنوان یک داروی یروتکودیلاتور ارزیابی نماییم. هدف از مطالعه این است که تغیرات اسپریومتریک در بیماران آسمی در اثر استفاده از بخور این دارو و داروهای آن تعیین و ارزیابی گردد.

**مواد و روش‌ها:** مطالعه حاضر به روش کارآزمایی بالیستی و به صورت دوسوکور انجام شد. نمونه‌ها پس از تشخیص بطور نصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. تمامی بیماران قبل از مداخله اسپریومتری شده و مقادیر  $FEV_1/FVC$  و  $FEV_1$  ثبت گردید و هریک از این دو گروه به مدت ۱۵ دقیقه تحت بخور دارو درمنه ساخت شرکت بارج اساس و دارونتما قرار گرفتند. پس از اتمام بخور اسپریومتری مجدد به عمل آمد و افرادی که حداقل ۱۰٪ پیشرفت در مقادیر بالا داشتند، بیرونی و مقایسه آماری شدند.

**یافته‌ها:** داسه سنتی بیماران ۵۰–۱۷ سال بود و از نظر ترکیب سنی و جنسی تفاوت معنی‌داری نداشتند. مدت زمان متوسط بیماری ۸/۳ سال بود. از نظر علامت بالیستی بیماران دو گروه با هم مشابه بودند و با اختلاف آنها به لحاظ آماری معنی‌دار نبود. شاخص  $FEV_1$  در ۴۰٪ بیماران گروه دارو و ۱۰٪ بیماران گروه دارونتما ( $P<0.01$ ) و شاخص  $FEV_1/FVC$  در ۵۰٪ بیماران گروه دارو و ۵۰٪ بیماران گروه دارونتما به میزان بیش از ۱۰٪ افزایش یافت (N.S).

**نتیجه‌گیری:** در گروه دارو شاخص‌ها بهبودی بیشتری از گروه دارونتما داشت و لی نسبت‌های پاسخ به درمان در هر دو گروه یکسان بود. مطالعه مشابه در جمیعت بیشتری از بیماران توصیه می‌شود و از **عکان کلیدی: افسردگی درمنه،  $FEV_1/FVC$ ، آسم**

۱- گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۲- دانشگاه علوم پزشکی گیلان

## مقدمه

۳- داروهای پایدارکننده غشاء ماست سل (۲). طب گیاهی از دیرباز در درمان بیماری‌ها مطرح بوده است و در این زمینه تجربه هزاران ساله طب سنتی چین و ایران در دست است. در این تحقیق بر آن شدیدم تا اثر افسرده گیاهی درمنه (Artemisia) که از عصاره‌های گیاهی و از خانواده کاسنی می‌باشد، را در درمان بیماران آسمی به عنوان یک داروی برونوکودیلاتور (برونکوآسپاسم) مورد ارزیابی قرار دهیم.

هدف از این بررسی تعیین تغییرات اسپرورومتریک در بیماران مبتلا به آسم در اثر استفاده از بخور این داروی گیاهی است (۵).

## مواد و روش‌ها

این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی و به صورت دوسوکور انجام شد. نمونه‌ها از بین بیماران مراجعة‌کننده به درمانگاه رازی و بیماران معرفی شده توسط پزشکان همکار طرح، انتخاب شدند. کلیه نمونه‌ها در گروه سنی بالای ۱۷ سال و کمتر از ۵۰ سال قرار داشتند و قبل از آن و تاکنون استروتید خوراکی یا استنتشافی دریافت نکرده بودند و در فاز حمله حاد آسم نبودند.

کلیه نمونه‌ها پس از بررسی اولیه و رد سایر علل تنگی نفس و تشخیص نهایی آسم، به صورت تصادفی و یک در میان به ۲ گروه تقسیم شدند. بیماران پس از تقسیم‌بندی و قبل از مداخله، اسپرورومتری شدند و مقادیر  $\text{FVC}$  و  $\text{FEV}_1$  ثبت گردید. سپس بیماران هریک از دو گروه به مدت ۱۵ دقیقه تحت تاثیر بخور افسرده درمنه ساخت شرکت باریج اسنس (A) یا دارونما قرار گرفتند. بخور دارونما کاملاً از نظر ظاهری شبیه دارو بود. ۵۰ دقیقه بعد از اتمام بخور مجدداً اسپرورومتری به عمل آمد و مقادیر  $\text{FEV}_1$

آسم یکی از قدیمی‌ترین بیماری‌های شناخته شده و شایع‌ترین بیماری مزمن دوران کودکی است. تخمین‌زده می‌شود که ۷/۴/۵ مردم آمریکا به آن مبتلا باشند (۱). آمارهای منتشر شده حاکی از این است که در سال ۱۹۸۸ در ایالات متحده آمریکا پانزده میلیون بیمار سرپایی مبتلا به آسم توسط پزشکان ویزیت شده‌اند و حدود دو میلیون روز بستری در بیمارستان جهت درمان آسم گزارش شده است. سالانه حدود ۳ میلیارد دلار خرج مراقبت و درمان بیماران مبتلا به آسم می‌شود (۲). آسم بیشتر در اوایل عمر بروز می‌کند به طور کلی حدود نیمی از تمام موارد آسم قبل از ده‌سالگی  $\frac{1}{3}$  قبل از ۴۰ سالگی روی می‌دهد (۳). میزان مرگ و میر ناشی از آسم پائین است. آخرین ارقام نشان می‌دهند که میزان مرگ و میر کمتر از ۵۰۰۰ مورد در ده‌میلیون بیمار مبتلا است. ۸۰-۵۰٪ بیماران از پیش‌آگهی خوبی بروخوردار هستند. تعداد کودکانی که ۷ تا ۱۰ سال بعد از تشخیص اولیه هنوز آسم دارند بین ۷۸-۲۶٪ است. یافته‌های بالینی آسم عبارتند از تنگی نفس، سرفه و ویزینگ. بهترین و مطمئن‌ترین روش تشخیص و نیز پاسخ به درمان اسپرورومتری است (۴). یافته‌های اسپرورومتری در بیماران به صورت کاهش  $\text{FEV}_1$  کاهش کمتر  $\text{FVC}$  و کاهش  $\text{FEV}_1/\text{FVC}$  تا کمتر از ۷۵٪ است. درمان آسم شامل رفع انسداد راههای هوایی و التهاب است. رفع انسداد باید با اندازه گیری شاخص‌های انسداد راه هوایی مانند  $\text{FEV}_1$  تأیید شود (۴). داروهای موجود جهت درمان آسم به دو گروه تقسیم می‌شوند:

- ۱- داروهایی که از انقباض عضلات صاف جلوگیری می‌کنند مثل آگونیست‌های  $\beta$  ادرنرژیک، متیل گزانتین‌ها و آنتی‌کولیتزریک‌ها.
- ۲- داروهایی که از التهاب جلوگیری کرده یا آن را برطرف می‌کنند. مثل گلوكورتيکوتيدها

نفس در ۹۵٪ از افراد گروه دارو و ۹۰٪ از گروه دارونما، سرفه در ۹۰٪ از گروه دارو و ۷۵٪ از گروه دارونما، ویزینگ در ۵۰٪ از بیماران گروه دارو و ۶۰٪ از بیماران گروه دارونما. در جدول شماره ۱ تأثیر داروی گیاهی را بر تغییر شاخص‌های اسپیدومتریک بیماران آسمی ارائه گردیده است و نشان می‌دهد که شاخص  $FEV_1$  در ۹ نفر از بیماران (۴۵٪) گروه دارو بیش از ۱۰٪ افزایش داشته است در حالی که تعداد آن در گروه دارونما ۳ نفر (۱۵٪) بود و این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار بود ( $P<0.05$ ).

شاخص  $FVC$  در ۶ نفر از بیماران (۳۰٪) گروه دارو بیش از ۱۰٪ افزایش داشت در حالی که این تعداد در گروه دارونما ۲ نفر (۱۰٪) و این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار بود ( $P<0.01$ ).

شاخص  $FEV_1/FVC$  در ۱۰ نفر (۵۰٪) از بیماران گروه دارو و ۱۰ نفر (۵۰٪) از گروه دارونما افزایش یافت و اختلاف آنها از لحاظ آماری معنی دار نبود (NS).

$FEV_1/FVC$  پس از مداخله، ثبت گردید.

افرادی که حداقل ۱۰٪ پیشرفت در مقادیر فوق الذکر در اسپیدومتری بعد از مداخله نسبت به قبل داشتند به عنوان موارد بهبودی به عنوان عدم پاسخ به درمان تلقی شدند. اطلاعات به دست آمده از دو گروه شاهد و درمان به طور جداگانه محاسبه شده به وسیله آزمون آماری کای دو یا دقیق فیشر مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.

#### یافته‌ها

تعداد بیماران گروه دارو ۲۰ نفر بود که از این تعداد ۱۲ نفر مرد و ۸ نفر زن بودند. سن در گروه دارو  $10/4 \pm 32/75$  سال بود. در گروه دارونما از ۲۰ نفر بیمار اولیه، ۱۱ نفر مرد و ۹ نفر زن بودند. میانگین (± انحراف معیار) سن در گروه دارونما  $13/8 \pm 37/5$  سال بود. دو گروه از نظر سن و جنس تفاوت آماری نداشتند. مدت زمان ابتلا به بیماری در ۲ گروه بطور متوسط  $8/3$  سال بود. علامت بالینی بیماران دو گروه قبل از انجام مداخله از انجام مداخله یکسان بود و عبارت بود از: تنگی

جدول ۱- توزیع بیماران آسمی بر حسب تغییر شاخص‌های اسپیدومتریک در دو گروه دارو و دارونما

$FEV_1$		$FVC$		$FEV_1$		شاخص‌ها
نداشته	داشته	نداشته	داشته	نداشته	داشته	
(۵۰)۱۰	(۵۰)۱۰	(۹۰)۱۸	(۱۰)۲	(۸۵)۱۷	(۱۵)۳	گروه‌های دارونما (شاهد) (N=۲۰)
(۵۰)۱۰	(۵۰)۱۰	(۷۰)۱۴	(۳۰)۶	(۰۵)۱	(۴۵)۹	گروه دارو (مورد) (N=۲۰)
NS		$(P<0.1)$		$(P<0.05)$		نتیجه آزمون

\* اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند

ولی روی نسبت  $\frac{FEV_1}{FVC}$  تأثیری ندارد. سابقه استفاده از گیاهان دارویی به طب هزار ساله گیاهی در چین، هند و ایران باز میگردد. ولی تعداد

#### بحث

تحقیق نشان داد که بخور داروی گیاهی درمنه باعث بهبود شاخص‌های  $FEV_1$  و  $FVC$  می‌شود

گونه‌های مختلف این گیاه در طبیعت یافت می‌شود، و در درمان بیماریهای مختلف از جمله مalaria، هپاتیت، انواع التهاب و عفونت‌های فارچی، باکتریایی و ویروسی استفاده شده است<sup>(۶)</sup>. همچنین به عنوان ضدتب، مسکن، ضدخارش و شلکتnde عضلات صاف شریانی و مجاري تنفسی کاربرد دارد. از برگ‌های گیاه محلول‌های ضدعفونی کننده و بخور تهیه می‌شود جوشانده برگ‌های آن جهت رفع سرفه و بازکردن قاعدگی مصرف دارد<sup>(۷)</sup>. جوشانده درمنه به میزان ۶-۲-گرم در ۱۰۰ سانتی‌متر مکعب آب برای درمان تنگی نفس، دلپیچه، سکسکه و درد کشاله ران بسیار مفید دانسته است<sup>(۸)</sup>.

بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به نتایج فوق الذکر استفاده از داروی مذکور باعث افزایش شاخص‌های اسپیرومتری در بیماران آسمی می‌شود با توجه به تعداد بیماران در دو گروه، مطالعه وسیع تری جهت تأیید اثر دارو پیشنهاد می‌گردد.

مطالعاتی که بطور دقیق و علمی اثرات گیاهان را بررسی کند، حداقل در جامعه پزشکی ما چندان زیاد نیست. به همین منظور، مطالعه حاضر اثرات افسرده گیاهی درمنه را به عنوان داروی برونکو دیلاتور (آن گونه که در راهنمای دارویی آن ادعا شده است)، مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه بیماران مبتلا به آسم خفیف یا متوسط براساس تشخیص کلینیکی و معیارهای اسپیرومتری در دو گروه دارو و دارونما به صورت تصادفی تقسیم شدند و تحت درمان با بخور داروی گیاهی درمنه و بخور دارونما که از نظر بو و خواص ظاهری مشابه دارو بود قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده از اسپیرومتری قبل از مداخل و بعد از مداخله، بیماران به دو دسته تقسیم شدند. مواردی که با افزایش بیش از ۱۰٪ در FVC و FEV1 و با افزایش در FEV1/FVC همراه بود، به عنوان پاسخ به درمان و بقیه موارد عدم پاسخ در نظر گرفته شدند.

## References:

1. Anderson JA. Immunology and Allergy Clinic of North American. 1991. 212-16.
2. Mcfadden, R. Asthma, IN Wilson JO, Braunwald E, Isselbacher KJ, et al (eds) Harrison's principles of internal medicine. 14th ed. New York, Mc Graw Hill, 1998; 1419-1425.
3. Bierman CW, Pearlman D. Ashlma; In Chernick, r, etal (eds). Kendig's Disorders of Respiratory Tract in Chidren. 5<sup>th</sup> ed, W. B. Saunders company, 1990; page 448.
4. Drazen GM Asthma' In Bennett, Pulm, Gill, etal (eds). Cecil Textbook of Medicine. 20th ed. W.B. saunders company, 1996. 376-381.
5. Huang L , Liv Jf, Liv LX, etal. Antipyretic and antinflammatory effect of Artemisia. Annu Rev Med 1993; 18(1): 44-8.
5. Tan RX, Zheng WF, Tang HO. Biologically Active Substances from the genus artemisia. Planta Med. 1998; 64(4): 295-302.

۷- زرگری علی. گیاهان دارویی: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم؛ آبان ۱۳۶۸، جلد سوم، صفحه ۶۰-۶۶

۸- امی غلامرضا. گیاهان دارویی سنتی ایران. انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جلد اول، صفحه ۴۸-۶۹