

Comparing buspirone effect with the extract of borage (*Echium amoneum L*) flower on learning in adult male rats

Javid Z¹, Hoseini SE^{2*}

1- Department of Physiology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, I. R. Iran.

2- Department of Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, I. R. Iran.

Received August 12, 2015; Accepted July 13, 2016

Abstract:

Background: Learning as one of the higher functions of the brain is affected by several factors. Anxiety disorders are among the factors result in learning disorders. Considering the side-effects of anxiolytics, this study aimed to compare the effects of buspirone with borage flower extract on learning in adult male rats.

Materials and Methods: In this experimental study, adult male rats (no=40) were divided into 5 groups: Control, Sham and 3 Experimental groups (Buspirone 5 mg /kg, Borage extracts 150 mg/kg and Buspirone+extract). All injections were carried out intraperitoneally for 14 days. Conditioned Place Preference was used to assess the learning.

Results: The results of Extract group showed a significant improvement after 7 days of drug injection ($P \leq 0.05$). In addition, a significant improvement was observed in Buspirone, Extract and Buspirone + Extract groups 14 days after drug injection.

Conclusion: The results of the study showed that the buspirone and the borage augment the learning in rats.

Keywords: Buspirone, *Borago officinalis*, Learning, Rat

*** Corresponding Author.**

Email: ebrahim.hossini@yahoo.com

Tel: 0098 917 1183 917

Fax: 0098 714 331 1172

Conflict of Interests: No

Feyz, Journal of Kashan University of Medical Sciences, October, 2016; Vol. 20, No 4, Pages 323-330

Please cite this article as: Javid Z ,Hoseini SE. Comparing buspirone effect with the extract of borage (*Echium amoneum L*) flower on learning in adult male rats. *Feyz* 2016; 20(4): 323-30.

مقایسه اثر بوسپیرون همراه با عصاره گل گاوزبان (Echium amoenum L.) بر میزان یادگیری در موش‌های صحرایی نر بالغ

*^۱ زینب جاوید ، سید ابراهیم حسینی

خلاصه:

سابقه و هدف: یادگیری یکی از تکامل یافته‌ترین اعمال سیستم عصبی مرکزی است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. اختلالات اضطرابی از عواملی است که باعث کاهش یادگیری می‌شوند، بنابراین با توجه به عوارض داروهای شیمیایی ضد اضطراب، این مطالعه با هدف بررسی مقایسه اثر داروی بوسپیرون همراه با عصاره گل گاوزبان یادگیری در موش‌های صحرایی نر بالغ انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی از ۴۰ سر موش صحرایی نر بالغ استفاده شد که به ۵ گروه کنترل، شاهد و ۳ دسته تجربی دریافت کننده داروهای بوسپیرون ۱۵۰mg/kg، عصاره گل گاوزبان و بوسپیرون همراه با عصاره گل گاوزبان تقسیم شدند. کلیه تجویزها به صورت درون صفاتی و برای مدت ۱۴ روز انجام گرفت. در این بررسی به منظور تشخیص میزان یادگیری از روش ترجیح مکانی شرطی شده استفاده گردید.

نتایج: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بعد از ۷ روز از تجویز داروها، تنها در گروه دریافت کننده عصاره گل گاوزبان افزایش معنی-دار ($P \leq 0.05$) مشاهده می‌شود. همچنین، بعد از ۱۴ روز از تجویز داروها در گروه‌های دریافت کننده بوسپیرون، عصاره گل گاوزبان و بوسپیرون همراه با عصاره گل گاوزبان افزایش معنی‌داری در میزان یادگیری حیوانات مشاهده می‌شود.

نتیجه گیری: در مجموع می‌توان گفت که بوسپیرون و گل گاوزبان یادگیری حیوانات مشاهده می‌گردد.

واژگان کلیدی: بوسپیرون، گل گاوزبان، یادگیری، موش صحرایی

دو ماهنامه علمی- پژوهشی فیض، دوره بیست، شماره ۴، مهر و آبان ۱۳۹۵، صفحات ۳۳۰-۳۲۳

اثر مهاری باکلوفن (آگونیست گیرنده‌های گابا) بر حافظه و یادگیری را آناتاگونیزه نماید و این اثر با افزایش غلظت دارو بر ماندگاری حافظه افزایش می‌یابد [۳]. گل گاوزبان ایرانی گیاهی با نام علمی *Echium amoenum* L. از خانواده Boraginaceae می‌باشد که در نواحی شمالی ایران به صورت خودرو می‌روید [۴]. در یک بررسی نشان داده شده است که عصاره گل گاوزبان به دلیل خواص آنتی اکسیدانی قوی دارای ویژگی ضد اضطرابی است [۵]. مواد موثره موجود در این گیاه شامل آنتوسبانیدین، فلاونوئید آگلیکون و همچنین اسیدهای چرب گاما می‌باشد و به دلیل وجود این ترکیبات، در مطالعات حیوانی اثرات ضد تشنجی این گیاه به اثبات داده رسیده است [۶]. نشان داده شده است که مصرف ۱۴ روزه گل گاوزبان در انسان باعث کاهش پراکسیداسیون لیپیدهای خون می‌گردد که این ممکن است به دلیل وجود ترکیب‌های فعال زیستی از قبل فلافونوئیدهای موجود در عصاره این گیاه باشد [۷]. برخی از این ترکیب‌های فعال زیستی نظیر رزمارینیک اسید، دارای فعالیت ضد التهابی و سیانیدین-۳-گلوکوزید مهارکننده بیان ژن سیکلوکسیژنаз-۲ (COX-2) می-باشند [۸]. عصاره گل گاوزبان میزان گونه‌های فعال اکسیژن درون سلولی را از طریق فعالیت سیستم آنتی اکسیدان گلوتاتیون کاهش می‌دهد. دلفینیدین یکی از ترکیب‌های فعال موجود در گل گاوزبان است که باعث افزایش فاکتور نکروز کننده تومور آلفا (TNF-

مقدمه

یکی از تکامل یافته‌ترین اعمال سیستم عصبی، حافظه و یادگیری است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. یادگیری، مهارتی است که سبب افزایش فعالیت سیناپسی در مسیر هیپوکامپ- قشر پره‌فرونتال می‌شود [۱]. در فرایند حافظه و یادگیری، نوروترانسمیترهای استیل کولین و دوپامین دارای نقش کلیدی هستند؛ بدطوری که مطالعه دیگر ما نشان داد که داروی تری‌هگزی فنیدیل به عنوان آناتاگونیست استیل کولین با مهار مسیرهای دوپامینزیک ترجیح مکان شرطی (CPP) القا شده با مورفين را کاهش داده و موسیقی آرام با افزایش فعالیت نورون‌های دوپامینزیک CPP القا شده با مورفين را افزایش می‌دهد [۲]. نشان داده شده است که فلومازنیل به عنوان آناتاگونیست گیرنده‌های بنزوپریازپنی و از طریق اثر بر گیرنده‌های GABA_A قادر است

^۱ دانش آموخته روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

^۲ دانشیار، گروه فیزیولوژی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

* نشان نویسنده مسئول:

Shiraz، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه فیزیولوژی

تلفن: ۰۷۱۴۳۳۱۱۱۷۲، دورنوبس: ۰۹۱۷۱۱۸۳۹۱۷

پست الکترونیک: ebrahim.hossini@yahoo.com

تاریخ پذیرش نهایی: ۹۵/۴/۲۳ تاریخ دریافت: ۹۴/۵/۲۱

سر موش صحرایی نر بالغ با وزن تقریبی ۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم استفاده شد. حیوانات به ۵ گروه ۸ تایی شامل گروه کنترل، شاهد و ۳ دسته تجربی تحت تیمار با بوسپیرون با دوز ۵، عصاره گل گاوزبان mg/kg + ۵ mg/kg عصاره گل گاوزبان mg/kg، ۱۵۰ mg/kg، بوسپیرون با دوز ۱۵۰ mg/kg تقسیم شدند. در این مطالعه داروی بوسپیرون از شرکت داروپخش ایران خریداری شده و برای تهیه عصاره گل گاوزبان از روش پرکولاسیون استفاده شد؛ برای این کار به مقدار کافی گیاه گل گاوزبان از نواحی کلاردشت در شمال ایران تهیه گردید و پس از تایید آن توسط بخش گیاه شناسی دانشگاه یاسوج و خشک نمودن گلهای آن، در آب خیسانده شد و آنگاه به کمک دستگاه همزن به خوبی هم زده شد تا به حالت یکنواخت درآید. سپس، ۲۰۰ گرم از مخلوط یکنواخت به دست آمده در ۳۲۰ میلی لیتر الكل ۷۰ درجه ریخته شد تا در دمای آزمایشگاه به مدت ۴۸ ساعت و دور از نور به خوبی خیسانده شود. در مرحله بعد، مخلوط به وسیله فیلتر صاف شده و با دستگاه روتاری مخلوط حاصل تغییل گردید و به کمک دستگاه دسیکاتور تمام رطوبت مخلوط گرفته شد تا عصاره‌ای با ویسکوزیته بالا و به میزان ۱۰ گرم به دست آمد. در این تحقیق حیوانات گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفتند و حیوانات گروه شاهد نیز به مدت ۱۴ روز و روزانه تحت تجویز درون صفاقی یک میلی لیتر آب مقطр قرار گرفته و گروه‌های تجربی نیز به طور مشابه با گروه شاهد از نظر زمانی تحت تجویز درون صفاقی داروهای بوسپیرون، عصاره گل گاوزبان و بوسپیرون به همراه گل گاوزبان با دوزهای فوق قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری میزان یادگیری در حیوانات در روزهای ۷ و ۱۴ بعد از تجویز از روش ترجیح مکانی شرطی شیشه‌ای به ابعاد ۱۵ cm×۳۷ cm×۱۵ cm که به دو بخش مجزا تاریک و روشن تقسیم شده بود، استفاده گردید [۲۶]. بین این دو بخش سیاه و سفید یک راهرو میانی قرار می‌گرفت و یک دریچه گیوتبینی بخش سیاه و سفید جعبه را از هم‌دیگر مجزا می‌ساخت. آزمون CPP دارای مراحل پیش‌شرطی و شرطی‌سازی است. مرحله پیش‌شرطی یک روز بود و در آن کلیه حیوانات به صورت تک‌تک و تصادفی در راهرو میانی جعبه قرار داده می‌شدند و این در حالی بود که دریچه گیوتبینی برداشته شده و حیوانات به مدت ۱۰ دقیقه به کل جعبه دسترسی داشتند. مدت زمان حضور حیوان در بخش سیاه و سفید جعبه بر اساس ثانیه ثبت شد. در این مرحله معمولاً حیوانات تمایلی نسبت به یک بخش خاص نشان نمی‌دادند. چنانچه هر حیوان مدت زمان بیشتری در یکی از بخش‌ها باقی می‌ماند، از گروه حذف می‌شود. در مرحله شرطی‌سازی که به مدت ۷

alpha) می‌شود [۹]. گل گاوزبان ایرانی گیاهی با خواص ضد افسردگی، ضد درد، ضد باکتری، آنتی اکسیدان و تعدیل کننده سیستم ایمنی است [۱۰-۱۴]. مطالعات نشان داده‌اند که تزریق درون صفاقی عصاره گل گاوزبان دارای خواص ضد اضطرابی است و برای درمان اختلالات اضطرابی مفید است [۱۵، ۱۶]. نشان داده شده است که عصاره گل گاوزبان با دارا بودن فعالیت آنتی اکسیدانی با کاهش ضایعات بافتی ناشی از ایسکمی مغزی باعث افزایش حافظه در حیوانات در شرایط بعد از ایسکمی مغزی می‌گردد [۱۷]. عصاره برگ گیاه گل گاوزبان باعث مهار فعالیت آنزیم استیل کولین استراز می‌شود [۱۸]. نشان داده شده است که پلاک-های بتا آمیلوئید در ناحیه هیپوکامپ باعث کاهش LTP می‌گردد و مصرف عصاره گل گاوزبان در افراد مبتلا به این اختلال باعث تقویت LTP می‌شود [۱۹]. بوسپیرون دارویی است که تمایل زیادی برای اتصال به گیرنده‌های سروتوینینی داشته و تمایل نسبی برای افزایش تولید و ترشح دوپامین و اثر بر گیرنده‌های آلفا-آدنرژیک دارد [۲۰]. به نظر می‌رسد بوسپیرون در درمان اختلالات اضطرابی با عوارض جانبی کمتر نسبت به بسیاری از داروهای دیگر مؤثرتر باشد [۱۳]. نشان داده شده است که آگوئیست‌های گیرنده‌های سروتوینینی ۵-HT_{1A} باعث افزایش فعالیت سروتو-نرژیک می‌شوند [۲۱]. بوسپیرون به عنوان آگوئیست گیرنده‌های ۵-HT_{1A} و تا حدودی آنتاگونیست گیرنده‌های D2 دوپامین باعث تقویت اعمال شناختی می‌گردد [۲۲]. ترجیح مکانی شرطی شده یک برنامه مبتنی بر رفتار است که از آن برای اندازه‌گیری قدرت اعتیاد‌آور داروها و هم‌چنین میزان حافظه و یادگیری وابسته به محرك‌های پاداش دهنده استفاده می‌شود [۲۳، ۲۴]. نتایج یک بررسی نشان داد که بین یادگیری و میزان اضطراب رابطه معکوس وجود دارد [۲۵]. با توجه به اثر منفی اضطراب در فرایند حافظه و یادگیری و هم‌چنین اثرات جانبی داروهای شیمیایی ضد اضطراب بر بدن و هم‌چنین با عنایت به آنکه تاکنون گزارشی مبنی بر اثرات منفی عصاره گل گاوزبان ارائه نشده است، این مطالعه با هدف مقایسه اثر داروی ضد اضطرابی بوسپیرون به همراه عصاره هیدرو-الکلی گل گاوزبان بر میزان یادگیری در موش‌های صحرایی نر بالغ انجام گردید.

مواد و روش‌ها

این مطالعه تجربی در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز انجام شد. پروتکل این تحقیق بر اساس قوانین بین‌المللی درخصوص حمایت از حیوانات آزمایشگاهی تنظیم شده و در کمیته اخلاق دانشگاه به تصویب رسید. در این پژوهش از ۴۰

نتایج

نتایج حاصل از آنالیز داده‌های این مطالعه نشان داد که بین گروه‌های کنترل و شاهد در مدت زمان ماندن در اتاقک تاریک و تاخیر در زمان ورود به اتاقک تاریک، اختلاف معنی‌داری مشاهده نمی‌شود، اما اگرچه تجویز ۷ روزه داروهای بوسپیرون و عصاره هیدرووالکلی گل گاو زبان بهتنهایی و همراه با یکدیگر باعث افزایش مدت زمان ماندن در اتاقک تاریک و کاهش مدت زمان تاخیر در ورود به اتاقک تاریک (محل پاداش) می‌گردد، ولی تنها در گروه دریافت کننده عصاره هیدرووالکلی گل گاو زبان این $P < 0.05$ افزایش در مدت زمان ماندن در اتاقک تاریک در سطح $P < 0.01$ معنی‌دار می‌باشد (جداول شماره ۱ و ۲). هم‌چنین، نتایج این بررسی نشان داد که تجویز ۱۴ روزه داروی بوسپیرون باعث افزایش معنی‌دار در مدت زمان ماندن در اتاقک تاریک در سطح $P < 0.001$ و کاهش معنی‌دار مدت زمان تاخیر در ورود به اتاقک تاریک در سطح $P < 0.0001$ می‌گردد (جداول شماره ۳ و ۴).

و ۱۴ روز بود، حیوانات پس از دریافت داروی مربوطه، به صورت جداگانه به بخش سیاه جعبه منتقل می‌شدند. در این مرحله دریچه گیوتینی بسته شده و حیوانات به مدت ۳۰ دقیقه در همان بخش باقی مانده و در معرض غذا که به عنوان پاداش خاص یا بخش جفت شده با محرك در نظر می‌شود، قرار می‌گرفتند [۲۴]. در این مرحله حیوانات گروه کنترل بدون دریافت دارو به بخش سیاه جعبه منتقل شدند. حیوانات گروه‌های تجربی نیز مقدار ۱ سی سی آب مقطر به صورت درون صفاقی دریافت نموده و سپس به بخش تاریک جعبه منتقل شدند. حیوانات گروه‌های تجربی نیز پس از دریافت دارو به بخش تاریک جعبه منتقل گردیدند. در روزهای آزمون دریچه گیوتینی برداشته شده و حیوانات به مدت ۱۰ دقیقه به کل جعبه دسترسی داشتند. مدت زمان حضور حیوانات در بخش تاریک و روشن جعبه بر اساس ثابت شد و مدت زمان حضور حیوانات در بخش تاریک جفت شده با غذا به عنوان داده اصلی تحت آنالیز آماری قرار گرفت و نتایج به دست آمده از گروه‌های مختلف با گروه کنترل و با یکدیگر مقایسه گردیدند. در پایان دوره آزمایش داده‌های به دست آمده از این پژوهش به وسیله نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش ۲۰ و از طریق آزمون‌های تجزیه واریانس یک‌طرفه و پیگیری توکی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و معنی‌داری اختلاف داده‌ها در سطح $P < 0.05$ در نظر گرفته شد.

جدول شماره ۱- میانگین و خطای معیار میانگین ($\bar{X} \pm SEM$) مدت زمان ماندن موش‌ها در اتاقک تاریک (TDC) در گروه‌های مختلف، ۷ روز پس از تجویز داروها

P (نسبت به گروه کنترل)	$\bar{X} \pm SEM$ (بر حسب ثانیه)	گروه‌های مختلف مطالعه
-	$64/00 \pm 4/95$	کنترل
.۰/۷۷۳	$61/43 \pm 6/81$	شاهد (آب مقطر)
.۰/۹۹۶	$71/17 \pm 14/02$	تجربی ۱ (بوسپیرون ۵mg/kg)
.۰/۰۵	$85/10 \pm 4/6*$	تجربی ۲ (عصاره هیدرووالکلی گل گاو زبان ۱۵۰mg/kg)
.۰/۹۸۷	$77/33 \pm 12/81$	تجربی ۳ (عصاره گل گاو زبان ۱۵۰ mg/kg + بوسپیرون ۵mg/kg)

* نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار در سطح $P < 0.05$ نسبت به گروه کنترل می‌باشد.

جدول شماره ۲- میانگین و خطای معیار میانگین ($\bar{X} \pm SEM$) مدت زمان تأخیر در ورود موش‌ها به اتاقک تاریک در گروه‌های مختلف، ۷ روز پس از تجویز

P (نسبت به گروه کنترل)	$\bar{X} \pm SEM$ (بر حسب ثانیه)	گروه‌های مختلف مطالعه
-	$5/50 \pm 1/87$	کنترل
.۰/۲۴۲	$6/57 \pm 1/64$	شاهد (آب مقطر)
.۰/۱۸۳	$2/17 \pm 0/87$	تجربی ۱ (بوسپیرون ۵mg/kg)
.۰/۰۱	$1/57 \pm 0/29*$	تجربی ۲ (عصاره گل گاو زبان ۱۵۰mg/kg)
.۰/۶۷۷	$2/73 \pm 0/68$	تجربی ۳ (عصاره گل گاو زبان ۱۵۰ mg/kg + بوسپیرون ۵mg/kg)

جدول شماره ۳- میانگین و خطای معیار میانگین ($\bar{X} \pm SEM$) مدت زمان تاخیر در ورود موش‌ها به اتفاق تاریک در گروه‌های مختلف، ۱۴

روز پس از تجویز

P (نسبت به گروه کنترل)	$\bar{X} \pm SEM$ (بر حسب ثانیه)	گروه‌های مختلف
-	۷/۰۰±۱/۱۵	کنترل
۰/۴۵۴	۵/۴۳±۱/۰۹	شاهد (آب مقطر)
۰/۰۰۱	۲/۱۷±۰/۸۷*	تجربی ۱ (بوسپیرون ۵mg/kg)
۰/۰۰۰۱	۱/۴۳±۰/۴۸**	تجربی ۲ (عصاره هیدروالکلی گل گاوزبان ۱۵۰mg/kg)
۰/۰۰۰۱	۱/۴۳±۰/۶۸**	تجربی ۳ (عصاره گل گاوزبان ۱۵۰mg/kg + بوسپیرون ۵mg/kg)

جدول شماره ۴- میانگین و خطای معیار میانگین ($\bar{X} \pm SEM$) مدت زمان ماندن موش‌ها در اتفاق تاریک (TDC) در گروه‌های مختلف، ۱۴

روز پس از تجویز

P (نسبت به گروه کنترل)	$\bar{X} \pm SEM$ (بر حسب ثانیه)	گروه‌های مختلف
-	۵۶/۱۷±۳/۰۵	کنترل
۰/۸۹۷	۵۴/۷۱±۹/۶۶	شاهد (آب مقطر)
۰/۰۰۱	۸۲/۰۰±۲/۰۹*	تجربی ۱ (بوسپیرون ۵mg/kg)
۰/۰۰۰۱	۸۳/۸۶±۳/۸۲**	تجربی ۲ (عصاره هیدروالکلی گل گاوزبان ۱۵۰mg/kg)
۰/۰۰۰۱	۸۳/۰۰±۴/۲۶*	تجربی ۳ (عصاره گل گاوزبان ۱۵۰mg/kg + بوسپیرون ۵mg/kg)

کولین انجام دهنده [۳۰]. هم‌چنین، آزمایشات انجام شده روی مدل-های حیوانی نشان می‌دهند که دوپامین از طریق افزایش LTP، در یادگیری نقش دارد [۳۱]. مشاهده شده است که کاهش میزان دوپامین تغییر در عملکردهای شناختی را موجب می‌شود [۳۲]. چندین تحقیق نشان داده است که گیرنده‌های D2 دوپامین نیز در اعمال شناختی نقش دارند؛ به طوری که استفاده از آگونیست‌های گیرنده D2 از جمله برومومکرپین باعث تسهیل حافظه کاری می‌شود، از طرفی آسیب حافظه کاری بعد از مصرف آنتاگونیست‌های D2 نیز مشاهده می‌گردد. علاوه بر آن، این امکان وجود دارد که تحريك گیرنده‌های D1 و D2 دوپامین باعث بهبود حافظه کاری گردد که به علت فعالیت مشترک این دو نوع گیرنده در این امر می‌باشد [۳۴، ۳۳]. لذا، با توجه به تاثیر مثبت عصاره هیدروالکلی گل گاوزبان در تحريك ترشح دوپامین [۳۵]، افزایش حافظه در گروه‌های دریافت کننده گل گاوزبان قابل توجیه است. در یک بررسی نشان داده شده است که آگونیست‌های گیرنده‌های سروتو-نینی ۵-HT_{1A}-۵-HT_{2A} از جمله بوسپیرون باعث افزایش فعالیت سروتونرژیک و تحريك ترشح دوپامین می‌گردند [۲۱، ۲۲]. بنابراین، با توجه به آنکه استفاده از آگونیست‌های ۵-HT_{1A} نظیر بوسپیرون و هم‌چنین عوامل محرك ترشح دوپامین باعث افزایش یادگیری در حیوانات می‌شوند [۳۶، ۳۱]، لذا احتمالاً داروی بوسپیرون به تنهایی و همراه با عصاره گل گاوزبان از طریق

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز ۷ روزه عصاره هیدروالکلی گل گاوزبان و ۱۴ روزه داروهای بوسپیرون و عصاره هیدروالکلی گل گاوزبان هر کدام به تنهایی و همراه با یکدیگر باعث افزایش مدت زمان ماندن و کاهش در زمان تاخیر در ورود موش‌های صحرایی به داخل اتفاق تاریک (محل دریافت غذا به عنوان پاداش) می‌گردد که این به معنی اثر این داروها در تقویت حافظه در این حیوانات می‌باشد. هم‌سو با نتایج این بررسی نتایج یک مطالعه دیگر حاکی از آن است که ایسکمی مغزی باعث کاهش حافظه و فعالیت حرکتی و آسیب‌های آناتومیک مغزی می‌شود، در حالی که پیش درمان با عصاره گل گاوزبان باعث کاهش آسیب‌های بافتی در مغز و تقویت حافظه و افزایش فعالیت حرکتی در موش‌های صحرایی می‌گردد [۲۷]. هم‌چنین، هم‌سو با نتایج بدست آمده از این بررسی در مطالعات دیگری نیز نشان داده شده است که بوسپیرون به عنوان آگونیست گیرنده‌های ۵-HT_{1A} و تا حدودی آگونیست گیرنده‌های D2 دوپامین باعث تقویت اعمال شناختی و حافظه می‌شود [۲۸، ۲۲]. دوپامین به عنوان یک سوبسترای بالقوه در شکل پذیری سیناپسی و مکانیسم‌های دخیل در حافظه معرفی گردیده است [۲۹]. پیشنهاد شده است که گیرنده‌های D₂ دوپامینی در ناحیه هپیوکامپ شکمی، در عملکرد حافظه دخالت دارند که ممکن است این کار را با تنظیم رهاسازی استیل

بوسپیرون باعث کاهش میزان اضطراب در موش‌های صحرایی می‌گردد [۴۰]. بنابراین، با توجه به اثرات ضد اضطرابی گل گاوزبان و داروی بوسپیرون (به عنوان آگونیست سروتونین) افزایش یادگیری در گروه‌های دریافت‌کننده داروهای فوق احتمالاً به ویژگی‌های ضد اضطرابی این داروها نیز مربوط می‌شود.

نتیجه‌گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز ۷ روزه عصاره گل گاوزبان باعث افزایش مدت زمان ماندن و کاهش مدت زمان تأخیر در ورود به اتفاق تاریک (محل پاداش) می‌شود. همچنین، نتایج این بررسی نشان داد که تجویز ۱۴ روزه داروی بوسپیرون و عصاره هیدرولالکلی گل گاوزبان هرکدام به تنهایی و همراه با یکدیگر باعث افزایش معنی‌دار در مدت زمان ماندن در اتفاق تاریک و کاهش معنی‌دار در زمان تأخیر در ورود به اتفاق تاریک می‌گردد که این نشان‌دهنده تاثیر هر دوی آن‌ها در افزایش یادگیری است.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان مقاله بر خود واجب می‌دانند تا از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز که امکانات موردن نیاز جهت انجام این مطالعه را فراهم نمودند، تقدیر و تشکر بنمایند.

References:

- [1] Laroche S, Davis S, Jay TM. Plasticity at hippocampal to prefrontal cortex synapses: dual roles in working memory and consolidation. *Hippocampus* 2000; 10(4): 438-46.
- [2] Tavakoli F, Hoseini S, Mokhtari M, Vahdati A. Effect of memory attenuation and light music on morphine dependency in male mature mice using conditioned place preference. *Feyz* 2014; 18(1): 1-8. [in Persian]
- [3] Sarihi A, Mohammadi Z, Mirazi N, Komaki A. Effect of post-training flumazenil administration on baclofen-induced amnesia in passive avoidance learning. *Feyz* 2014; 18(2): 110-15. [in Persian]
- [4] Sylvers P, Lilienfeld SO, LaPrairie JL. Differences between trait fear and trait anxiety: Implications for psychopathology. *Clin Psychol Rev* 2011; 31(1): 122-37.
- [5] Sayyah M, Siahpoosh A, Khalili H, Malayeri A, Samaee H. A Double-Blind, Placebo-Controlled Study of the Aqueous Extract of Echium amoenum for Patients with General Anxiety Disorder. *Iran J Pharm Res* 2012; 11(2): 697-01.
- [6] Heidari MR, Mandegary A, Hosseini A, Vahedian M. Anticonvulsant Effect of Methanolic Extract of Echium amoenum Fisch and C.A. Mey. Against Seizure Induced by Picrotoxin in Mice. *Pakistan J Biological Sci* 2006; 9(4): 772-76.
- [7] Ranjbar A, Khorami S, Safarabadi M, Shahmoradi A, Malekiran AA, Vakilian K, et al. Antioxidant Activity of Iranian Echium amoenum Fisch & C.A. Mey Flower Decoction in Humans: A cross-sectional Before/After Clinical Trial. *Evid Based Complement Alternat Med* 2006; 3(4): 469-73.
- [8] Min J, Yu SW, Baek SH, Nair KM, Bae ON, Bhatt A, et al. Neuroprotective effect of cyanidin-3-O-glucoside anthocyanin in mice with focal cerebral ischemia. *Neurosci Lett* 2011; 500(3): 157-61.
- [9] Hwang MK, Kang NJ, Heo YS, Lee KW, Lee HJ. Fyn kinase is a direct molecular target of delphinidin for the inhibition of cyclooxygenase-2 expression induced by tumor necrosis factor-alpha. *Biochem Pharmacol* 2009; 77(7): 1213-22.

تحریک مسیرهای عصبی سروتونرژیک و دوپامینرژیک باعث تقویت حافظه در موش‌های صحرایی شده است. نشان داده شده است که ترکیب‌های فلاونوئیدی قادر به اثرگذاری مثبت بر حافظه کوتاه مدت می‌باشد [۳۷]. افزون بر این، فلاونوئیدها سبب بهبود خون‌رسانی به مغز شده و در افزایش حافظه و توانایی یادگیری نقش دارند. از مکانیسم‌های احتمالی اثرات فلاونوئیدها در عملکرد مغزی، ارتباط آن‌ها با فرآیندهای موثر در بقای سلول، تمایز و شکل‌گیری حافظه می‌باشد [۳۷]. بنابراین، با توجه به آنکه گل گاوزبان حاوی ترکیب‌های فلاونوئیدی فراوانی می‌باشد [۱۳]، افزایش میزان حافظه و یادگیری در گروه‌های دریافت‌کننده عصاره گل گاوزبان احتمالاً بدلیل اثر مثبت مواد فلاونوئیدی موجود در عصاره این گیاه باشد. مطالعه دیگر ما نشان داد که تری‌هگزی-فینیدبل به عنوان آتناگونیست استیل کولین با مهار سیستم‌های دوپامینرژیک باعث کاهش CPP القا شده با مورفین می‌گردد، در حالی که موسیقی آرام‌بخش با افزایش فعالیت سورونهای دوپامینرژیک CPP القا شده با مورفین را افزایش می‌دهد [۲] و از آنجا که گل گاوزبان نیز باعث افزایش دوپامین می‌شود، انتظار می‌رود باعث تقویت حافظه گردد. نتایج حاصل از مطالعات بیان‌گر آن است که اختلالات اضطرابی باعث اختلال در اعمال شناختی و حافظه می‌شوند [۳۹,۳۸]. همچنین، نشان داده شده است که داروهایی که باعث افزایش عملکرد سروتونین در مغز می‌شوند، ضمن کاهش اضطراب باعث تقویت حافظه نیز می‌گردند [۳۹]. مطالعه دیگر ما نشان داد که عصاره گل گاوزبان و داروی

- [10] Abolhassani M. Antibacterial effect of borage (*Echium amoenum*) on *Staphylococcus aureus*. *Braz J Infect Dis* 2004; 8(5): 382-5.
- [11] Heidari MR, Azad EM, Mehrabani M. Evaluation of the analgesic effect of *Echium amoenum* Fisch and C.A. Mey. extract in mice: Possible mechanism involved. *J Ethnopharmacol* 2006; 103(3): 345-9.
- [12] Rabbani M, Sajjadi SE, Vaseghi G, Jafarian A. Anxiolytic effects of *Echium amoenum* on the elevated plus-maze model of anxiety in mice. *Fitoterapia* 2004; 75(5): 457-64.
- [13] Batool F. Buspirone and Anxiety Disorders: A Review with Pharmacological and Clinical Perspectives. *Internet J Pharmacol* 2007; 5(2): 1-6.
- [14] Amirghofran Z, Azadbakht M, Keshavarzi F. *Echium amoenum* stimulate of lymphocyte proliferation and inhibit of humoral antibody synthesis. *Iran J Basic Med Sci* 2000; 25(3-4): 119-24.
- [15] Sayyah M, Boostani H, Pakseresht S, Malaieri A. Efficacy of aqueous extract of *Echium amoenum* in treatment of obsessive-compulsive disorder. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry* 2009; 33(8): 1513-16.
- [16] Komaki A, Rasouli B, Shahidi S. Anxiolytic Effect of *Borago officinalis* (Boraginaceae) Extract in Male Rats. *Avicenna J Neuro Psych Physiol* 2015; 2(1): e27189.
- [17] Safaeian L, Azami Tameh A, Ghannadi A, Akbari Naghani E, Tavazoei H, Alavi SS. Protective effects of *Echium amoenum* Fisch. and C.A. Mey. against cerebral ischemia in the rats. *Adv Biomed Res* 2015; 4(1): 107-13.
- [18] Mrudula G, Vrushabendra swamy BM, Jayaveera KN. Evaluation of nootropic activity of leaves of *Borago officinalis*. *Res J Pharm Biol Chem Sci* 2012; 3(3): 405-14.
- [19] Zargooshnia S, Shahidi S, Ghahremani-tamadon F, Nikkhah A, Mehdizadeh M, Soleimani Asl S. The protective effect of *Borago officinalis* extract on amyloid β (25-35)-induced long term potentiation disruption in the dentate gyrus of male rats. *Metabolic Brain Dis* 2015; 30(1): 151-6.
- [20] Holmes A, Parmigiani PF, Ferrari PF, Palanza P, Rodgers RJ. Behavioral profile of wild mice in the elevated plus-maze test for anxiety. *Physiol Behav* 2000; 71(5): 509-16.
- [21] Winsauer PJ, Delatte MS, Stevenson MW, Moerschbaecher JM. Effects of triazolam, 8-OH-DPAT, and buspirone on repeated acquisition in squirrel monkeys. *Exp Clin Psychopharmacol* 2002; 10(4): 392-9.
- [22] Pache DM, Fernandez-Perez S, Sewell RD. Buspirone differentially modifies short-term memoryfunction in a combined delayed matching/non-matching to position task. *Eur J Pharmacol* 2003; 477(3): 205-11.
- [23] Bardo MT, Bevins RA. Conditioned place preference: what does it add to our preclinical understanding of drug reward?. *Psychopharmacology (Berl)* 2000; 153(1): 31-43.
- [24] Regard M, Knoch D, Gütling E, Landis T. Brain Damage and Addictive Behavior. A Neuropsychological and Electroencephalogram Investigation. *Cog Behav Neurol* 2003; 16(1): 47-53.
- [25] Asadollahpour A, Fata L, Gharraee B. Metacognitive Anxiety and Immediate and Delayed Judgment of Learning: Discovering the Underlying Mechanisms of Anxiety in Wells' Theory. *Iran J Psychiatry Clin Psychol* 2011; 16(4): 412-19.
- [26] Funada M, Sato M, Makino Y, Wada K. Evaluation of rewarding effect of toluene by the conditioned place preference procedure in mice. *Brain Res Brain Res Protoc* 2002; 10(1): 47-54.
- [27] Safaeian L, Tameh AA, Ghannadi A, Akbari Naghani E, Tavazoei H, Alavi SS. Protective effects of *Echium amoenum* Fisch. and C.A. Mey. against cerebral ischemia in the rats. *Adv Biomed Res* 2015; 4(1): 107-12.
- [28] Christina M, Kory M, Sarah M, Chlebowski E, Shaw P, Cheng J, et al. A Combined Therapeutic Regimen of Buspirone and Environmental Enrichment Is More Efficacious than Either Alone in Enhancing Spatial Learning in Brain-Injured Pediatric Rats. *J Neurotrauma* 2014; 31(23): 1934-41.
- [29] Jay TM. Dopamine: A potential substrate for synaptic plasticity and memory mechanisms. *Prog Neurobiol* 2003; 69(6): 375-90.
- [30] Zarrindast MR, Barghi-Lashkari S, Shafizadeh M. The possible cross-tolerance between morphine- and nicotine-induced hypothermia in mice. *Pharmacol Biochemistry Behav* 2001; 68(2): 283-89.
- [31] Lisman JE, Grace AA. The hippocampal-VTA loop: controlling the entry of information into long-term memory. *Neuron* 2005; 46(5): 703-13.
- [32] Kline AE, Massucci JL, Marion DW, Dixon CE. Attenuation of working memory and spatial acquisition deficits after a delayed and chronic bromocriptine treatment regimen in rats subjected to traumatic brain injury by controlled cortical impact. *J Neurotrauma* 2002; 19(4): 415-25.
- [33] Floresco SB, Magyar O, Ghods-Sharifi S, Vexelman C, Tse MT. Multiple dopamine receptor subtypes in the medial prefrontal cortex of the rat regulate set-shifting. *Neuropsychopharmacology* 2006; 31(2): 297-09.
- [34] Liggins JT. The roles of Dopamine D1 and D2 receptors in working memory function. *MSURJ* 2009; 4(1): 39-44.
- [35] Faryadian S, Sydmohammadi A, Khosravi A, Kashiri M, Faryadayn P, Abasi N. Aqueous Extract of *Echium amoenum* Elevate CSF Serotonin and Dopamine Level in Depression rat. *Biomedical Pharmacol J* 2014; 7(1): 137-42.
- [36] Winsauer PJ, Delatte MS, Stevenson MW, Moerschbaecher JM. Effects of triazolam, 8-OH-

- DPAT, and buspirone on repeated acquisition in squirrel monkeys. *Exp Clin Psychopharma* 2002; 10(4): 392-9.
- [37] Ramirez MR, Izquierdo I, do Carmo BassolsRaseira M, Zuanazzi J, Barros D, Henriques A. Effect of lyophilised Vaccinium berries on memory, anxiety and locomotion in adult rats. *Pharmacol Res* 2005; 52(6): 457-62.
- [38] Nazarzadeh F, Moini F, Aghamohamadian H, Abdkhoda M. Autobiographical memory and metacognition in patients with obsessive-compulsive disorder and social anxiety. *J Shahrekord Univ Med Sci* 2015; 16 (6): 57-66. [in Persian]
- [39] Kumar R. Approved and investigational uses of modafinil: an evidence-based review. *Drug* 2008; 68(13): 1803-39.
- [40] Jayid Z, Hosseini SE. Comparison of the Effect of Echium amoenum with Buspirone on the Anxiety of Cruciate Maze in Adult Male Rats. *Horizon Med Sci* 2015; 21(4): 271-6. [in Persian]